

1 12 1 - 5 - 1 de 1 10 12 the second second De la Television de Tento

Tivra mi amigo el ? Antonio De volar embio estos principios De Medicina Textio Margo Heinte Treis delott ano = Dong But daguardich

PRINCIPIA MEDICINÆ,

EPITOME,

Et Totius Humani Corporis Fabrica seu ex Microcosmi Armonia Divinum,


Germen,

AD.D.

D. DIDACO OSSORIO,

& Anathomice Cathedre Methodice & Anathomice Cathedre Methodice & nunc Vespertinæ in Mexicana Academia Moderatore, S. Inquisitionis
Tribunalis à Secretis Regalisque ergastatuli sidelissimo Medico

& huius Novi-Regni Prothomedico.



T CVN LICENTIA.

Mexici, apud Heredes Viduz Bernardi Calderon.

AISIOMINS ENIMOMINE

TIVE TIES

Er Tomus Humani Corporis Esimica

(11/2)

CITY OF CONTRACT


D. D. D. ACO OSSORIO, S. E. F. D. ACO OSSORIO RELIGIO PER RELATION DE SECULIO DE LA CONTROL DE SECULIO DE SECU

Tribundis Secrets Related ergalization of the Medical School Secretary of the Profession of the Profes

G CVN LICENTIA.

Mexici, apud Herodes Vidua Bernardi Calderon.





SANCTISSIMAM

PATRONAM;

Quam meis ab incunabulis, cordis visceribus adiubantem Matrem elegi: & in meis humilioribus, studijs præexellentem semper habui misericordem pro huius operis lucro, invoco in auxilium

Dollor D. DIDACVS OSSORIVS, & PERALTA olim Chirugiæ, & Anathomiæ Cathedræ, Methodique medendi, & nune Vespertinæ moderator:

Sanctæ Inquisitionis Asigillo; Medicus, & huius Novæ-Hispaniæ

Prothomedicus.



Qua continentur in boc opere notabilia.

1. Anothomia latino sermone.

2. Tractatus de partibus.

3. Tractatus de diebus decretorijs, de signis, & de crisibus.

4. Demorbo Sancti Lazari Hispano

idiomate.

5. Anathomia lingua nostra proChyrurgis non latinis.

6. Septem Aphorismorum libri Hip=

pocratis ex litera Leoniseni.

7. Tabula in qua omnes Aphorismi consiliantur cum morbis in parti-

Pro insipientibus, tam in theorica, quam inpraxi necessaria.

SEN-

SENTIR

del Doctor, y Ma-stro Don Mathias de Santillan Cathedratico jubi ado de Prima de Philosophia de la Real Vniversidad, Canonigo Penitenciario, y Examinador Sinodal deste Arçobispado.

Ex.mo Señor

POR mandato de V.Ex. he reconocido los tratados, que presenta el Doctor Don Diego Ossorio, y Peralta, y no hallo inconveniente alguno para que se den à la Imprenta; este es mi sentir V.Ex. proveera lo que sucre servido. Mexico 12. de Febrero de 1684. años. Dr. D. Mathias de Santillan.

APROBACION

del Dr.D. Juan de Torres Moreno, Cathedratico jubilado de Prima de Medicina en la Real Vniver sidad Presidente de el Prothomedicato deste Reyno.

Ex. mo Señor

E N conformidad del decreto de V.Ex. de ocho de Febrero paßado deste año he visto estos tratados del Doctor D. Diego Ossorio, y Peralta Cathedratico de Visperas de Medicina, y Protho-Medico deste Reyno: y ballo ser vtiles, y necessarios para los Estudiantes: por lo qual siendo V.Ex. servido puede dar premisso para que se den à la estampa: Mexico, y febrero 14.de 1684.años

Dr.D. Juan de Torres Moreno

EL Exelentissimo Señor Marques de la Laguna, Virrey desta Nueva España & concedió su licencia por Decreto de 8. de Febrero de 1684, años para que se Imprima:

· IVDICIUM

quod hac inre, de Superioris mandato, tulit Doctor Don Barnabas Diez de Corduba, & Murillo, in Alma Mexicanen si Cathedrali. Metropolitana Ecclesia, pro sacrarum Scripturarum lectione ad Canonicatum Theologalemevectus, & in Archiepiscopali Curia pro Examinandorum delectu Synodalis præscriptus Censor.

ARI, & mentis indagine ad contemplandum, & animialacritate ad evolvendum haud minore voluptatis oblectamento allectus delicati Operis Lenocinio; quam obedientiæ stimulis agitatus Ordinarij nostri Decreto obsequutus; delatum mihi ad censuram lubens degustandum adini Opusculum medicale quod ex Vberrima Apollinis segete, fructibus qui sem opimis maturescente germinavit Autumno ope, & conamine D. D. Didaci ab Osserio, & Peralta; qui iam diu Medica Palladis candidatus in

in hac Vniver litate Regali pridem, eft Chirurgica, feu Ana thomica; inde Methodica, pollagodum Vespertina Cathedræpræpolitus moderamini femel aciterum buccinata acclamatione Magister, acinsuper islius Nova Hispania Prothomedicatus infulis mercede regla infignirus : vt hocce. quod ea primitus compaginandum super scriptione à fron te circunfert; Epitome totius bumani corperis fabri a feu ex Airocolmi armon'a; Apollinez phalangi palloce auri ir radianti vexillo conscriptis, medendi manuale affertoribus deferat luculentum, vbi humanæ structuræ interiori medullitus patefacto opificio, tota istius parvi mundi machina bre vi negotio ijs penitus innotescat, ad quos huiuscemoci fabricæ languorum malleo luentis vila prorfus est reparatio spectare: Opus sane, & tyris narum, & pralo ad publicam vtilitatem toto creditoris iure, fic fun chum qued nemine la tere debet id vel ethnicis nequaquam infolitum iri, quando quidem tabulas Hippocraticas, quas omnium Antesignanus, & Princeps ad viventium le vamen operoso labore medicatrices affatim coagmentaverat; no iam debilibus fragihis paginæ passi sunt exarari elementis, verum gloriosiori Asia Vniversa templo Diana apud Ephesum consecrato ad piarum ædium parietes appendendes solertissime tradiderunt. Potissimum quia res medicas scripturà posteritati mandare nulli profecto five statui, sivè conditioni, vel præcelso sanctimoniæ culmine sublimatis, vel dignitatis supremæ exaltatis fastigio, vel generosa quavis professione eminentibus, dissonum vnquam, vel aliquantisper apparuit; quominus Autor vir alias Clericali militiæ adferiptus, & facris aris Sacerdotij Sancti decoramine mancipatus, tanti muneris auctoramento in huiuscemodi peritiz dogmatibus ad Reipublica bonum cudencis refragari videatur; quin immo obsequij multum divino Pnæumati conciliare quemadmodum plerique præstitere Sanctorum, non modo qui medicandi victitantes industria ab omnibus, eius rei Professores noscuntur; vt è Martysum exercitu candidato Cosmas, & Damianus Arabes, Egææ sub Diocletiano, Vrcissinus Raven-

vennæ fub Paulino, Pantaleon Nicomediæ fub Maximiano: immò & Lucas ex Christi Domini Evangeliographis vnus Antiochenus Scriptor Bithynniz sub Iuliano, qui que terrarum alibi tormenta fortiter subeuntes generosi effusione cruoris pallidas suz Mineryz infulas ad facrarum efferentes alborem; tyrannidis virulentæ febrim, qua huius Mundi Pcin cipes zstuabant, medullitus restinxerunt, non inqua czleftis tantumdem aulæ hinc militis recensiti, qui dum Peregrinos in præsenti agerent Babylone, pro victu adhæserat Æsculapio, thalamum suo munere nobilirarunt Appollinis, verum etiam è triumphantium confessionis apud Calicolas laurea, non nulli, pia ad corporum medella monumenta codentes, idem apprime consecraverunt studium; vt Samp son Prælbyter Sæcularis Constantinopolitanus inter Græcos in Suo Manologio adeò celebris quod in cie sbi facra, apudnos in Martyrologio Romano quinta ante Kalendas Iulias, à Iu dicijs, caterisque foren sibusprorsus vacabant vt tradit in suis notis Baronius, & nomine, & fancta Purpura Cafaris: Is ergo non alirer, ac Iuvenalis conspicuus Narniensium Antiftes nec medicinæ in hiantes à sanctimonia villatenus aberra. runt. Columbanus insuper non minus vitæ candore quam lesuatorum erectione clarissimus inter alia; quæ suis Alumnis ædificationis molimina non illud inferius aquas videlicet medicinales, & ex herbis distillare, & ad agrotantium levamen, servare præscribir. Queis Petrus Vlyssiponensis edoc tus Episcopus Tusqulanus medicinæ doctitudinem, qua pollebar, non est dedignatus ad Pontificatum assumptus (vbi Ioannes XXII, est nuncupatus) testari, siquident voiversæ Ecclesiæ candelabro præfulgens ad tantæ altitudinis exaltatus fastigium ab aliquot Canonibus in artis huiusce graciam & problematibus non destitit conscribendis. Nec Gregorius ille Nazianzenus Præsul sacerrimus, qui antonomastica cunctorum vociferatione Theologus est acclamatus, & collapfam Constantinopoli sidem restituit; indignum tulit ad rei medica promotionem scriptis aliquantulum immorati vt Auctor est Beyerlinckius in suo magno theatro tomo 5. vbi -1197

idem plane, de altero refert, non inferioris nominis in Ecclesia splendenti columine, illo nimirum Io unne qui Damasci, tum sanctitate, tum sapientia, & orbi, & floruit empireo: quam obrem de proficuo adeo medendi libello feror edicere pro iudicio omni venire ex parte graphica perennandum maximopere cum nullum, five Religionis Ortodoxa nostratum integerrime puritati, five morum desiderate lionestati, sive recte, beneque vivendi probitati subodorari queat nocumentum, quidplam ve animarum valetudini destructivum afferre: immo exemplar obiicere ad ædificationem labentis corporis valde perspicuum, quippè quod totum il lius reserat Microcosmum. Vnde quod de Constantinopolitano suo Medico Sanctiffimus quondam Parens Gregorius ille Romanus Confessione Magnus, Doctoratu maior, & maximus Pontificatu, qua scatebat altitudine eloquij buccinarat scribens; non in congrue valet Mexiceo nostro adaptari. Illum enim quadruplici commendans epistola vt patet ex ipsarum Registro tomo 4. gradum ad quadragesimam libri 4. persiciens; optime theodori indoli, fanitati mentis, & animi puritati, quainiuncti sibi muneris incumbebat studio scriptorum, operumque suorum splendorem, & gratiam quels cunctos demulcebar alliciens, luculenter attribuit: Hoc tua cpera, hoc scriptatestansur, hoc de præsenti expertus sum, hoc te & hominibus amailem, & omn potenti Deo dionum in perpetuum faciat. Quia enim virtutum mater est charitas id circo benos operum fructus profers, quia ipsameorundem fructum in mente radicem tenes. Tanto ergo Gregoriano præconio in of. fenso valet pede Theodori nostri opusculum hocce decurrere, vt pote ex radice charitatis culta quidem mente rore virtutis erumpens, atque adeo valentioris vbertatis fructus præmittens optatos, maturum vndequaque debet prorsue iudi :ari graphiario, Sic censeo Mexici die 27. Aprilis M.DC, LXXXIV.

> Dr. D. Barnabas Diez de Corduba, & Murillo.

EL Señor Doctor Di Diego de la Sierra Canonigo Doctoral desta Metropoli Consultor del Santo Officio de la Inquisicion, Cathedratico propietario de Decreto en la Real Vniversidad, Juez, Provisor, y Vicario General, Governador deste Arçobispado por el Ilmo Señor Doctor D. Francisco de Aguiar, y Seixas del Consejo de su Magestad Arçobispo de Mexico Concedió su licencia para la Impression deste Libro vista la Aprobazion de atras del Señor Canonigo Doctor D. Bernabe Diaz de Cordoba, y Morillo por Auto de 28. de Abril de 1684. años ante Bernardino de Amezaga N. rio publico.

Solver of the solver of



PROEMIVM.

Ificile satis agredimur opus (STV-DIOSI,& PERITI) in incognitum satis, humani corporis partium examen ingredimur; sed nobis Deo propitio, eiusque lucidiori gratia slugentissima

Matre MARIA DE GVADALVPE. Protectrice omnia si, & difficilima luce clariora, & facilima innotecent, & quia tractatus veritatem, & brevitatem inquiro in viriusque exordium ingredior. Valete.

Inquirit quid sit Anathomia, quas aferat

Vtilitates?

A Nathomia nomen arabum est; idem Latinis ac divitio sonat; ideoque in communi estialiter, his verbis definitur, Anathomia est partium simplicium, & instrumentalium corporis humani recta divitio. Optima enim est definitio quia per verum genus (ve lydivitio ostendit) & per veram diferentiam (ve relique particula conmostrant) traditur.

Anathomia, alia est vniversalis, respectu totius corporis, particularis respectu aliculus membri, auc

regionis aliculus filicet, cerebri, pectoris, aut ven-

tris inferioris, &c.

Deinde Anathomia vt sic:pars est essentialissima medicinæ, & est daplex docens, & vtens vtraque est scientia, quia est evidens cognitio reiper caussis, & demonstrationes, sine formidinine acquisita: alia est practica, & alia speculativa. Speculativa est que sistit in vera partium cognitione, & contemplatione, intota latitudine spsaram. Practica est quæ ad opus reducitur per manus opera regulas, & pracepta recta divitionis: nam si prœmialia huius tractatus desideratis, discurssum, facile, vt veri Phylosophi, potestis facere:interim igitur ad alia progrediamur. Vtilitates, quas afert Anathomia. 1.2 Est vt qui

Ouss a- cam callet laudes Deo optimo, & maximo, pro confort A14- textura, & compositione corporis humani, & recto consensu partium redat. 2.2 Est cognitio cuius libet partis in proprio citu, figura, numero, & magnitudine, instanțu sanitatis, & morbi secundum propriam remperiem, aut facultatem, aut actionem, &c. 3.2 Est quod ex cogitione partium recta resultat, quo modo vna pars per propriam vicinitatem, aut munus ipsius aliam per consensum lædat. 4.2 Locum afectum luce patentiorem redit, vt doctus, aut rationalis Medicus parti affectæ medicamento indicato sucurrat: sunt, & aliz vtilitates quam plutimæ quas vos in experientia invenietis.

SECTIOII. Quid sit corpus humanum, & partes ipsius?

Corpus humanum, est vnum totum substantiale explaribus aut diversis partibus exornatum cum recto ordine, & organisatione completum. Optima corporis humani definitio vt discurrendo per singula definitionis patebit, vbi advertite Anatohmiam non respicere formam substantialem informativam corporis in hac specie rationali, aut cadaveris; sed totum corpus, vt completum ex partibus integrantibus. Constituentibus eum substantibus integrantis (à quantitate in distincta) nam respectus alius, & consideratio corporis diversia ad alias scientias spectabit.

Circa definitionem partis, aliæ quam plurimæ sont definitiones, sed quia nullam intedo in hac epitome controversiam movere; tantum modo definitionem Galleni referam lib. 1. de vssu partium cap. 1. per hæc verba. Pars est quæ neque vnde quaque sur consuncta est alijs; in qua definitione, descriptive, & improprie locutus est Gallenus, & patet quia prius est esse quam sircunscribi: ergo non eam exquist tissime definivit neque per primarium conceptum, preter quam quod omnis pars dicitur ad al ud: ergo per propriam circunscriptionem non bene desinitur, sed quia brevitatem desidero sie propriam par-

Az

Definitio tis definitionem accipite. Pars est corpus toti cohapartis. rens communi, etiam vita coniuctum, ad illius fun-Hionem, & v offum comparatum, quæ definitio vt optima est amplexanda, primo quia per primarium conceptum explicar effentiam partis, deinde quia traditur per verum genus, & diferentiam, vt patet perly corpus, quod se habet ve genus, & reliqua se habent ve diferentia, ve magis in subsequentibus patebit.

Vnde in primis dividitur pars in similarem, & disimilarem 1.2 Homogenea, & simplex est, & est Pars fim corpus cuius partes eandem habent definitionem, & no. men cumtoto: & huius modisunt (ex Galleni doctrina lib. citato de Visu part. per totum) cutis, membra. na carnossa, adeps, fibra, tendo, os, cartilago, ligamentum, & si quæ aliz sunt huiusmodi.

plex.

Disimilaris autem, quæ dicitur secunda, ethero-Bars co- genea, & copolita est corpus cuius partes, non habent fen infru eandem definitionem, & nomen cum toto, ve pes, mamanielis. nus, cor, & caput, &c.. Quia quæliber pars capitis non est caput; sicuti pars quælibet ossis est os, sed sirca venas, nervos, & arterias valde est dicidium inter-Authores Medicos; an sint partes similares, velin--Arumentales? Quam controvertiam intractatu de partibus (Deo favente) exagitabimus.

Ex quibus infero r. quod in omni parte devet, Medicus aut Doctus Chyrurgus considerare temperamentum partis proprium, quod consistit in pri-

mis.

mis qualitatibus, deinde quod sequitur ipsum temperamentum, vt mollisem, duritiem, raritatem, densitatem, figuram, magnitudinem, numerum, & situm, deinde actionem cuiuslibet partis, an sit propria, an communis? Nam actio propria illa dicitur, quæ vni tantum parti, aut membro competit, & non alijs veluti vissio in oculo (mediante humore chrystalino) chylisicatio in ventriculo, sanguisicatio in hepate, & spirituum vitalium generatio in sinistro venticulo cordis, & spirituum animalium in cerebro.

Actio communis dupliciter accipitur, vel enim est communis, quia in omnibus partibus reperitur, comunis veluti actio facultatis atractricis, retentricis, con-duplex. coctricis, & expultricis, quæ in simplicibus, & compositis reperitur partibus, vel actio est communis, quia vniversso corpori aliqua virtute succurrit communi, vt actio ventriculi respectu chyli, & actio nervorum in sensatione arteriarum in spiritu vitalitate, venarum in delatione sanguinis, vt docet Gal. lib. r. de Vssu partium cap. 21. & 13. & ratio est, quia hæ partes dependent ab alijs pricipibus, tanqua ex fontibus comunibus, & vniversali corporinecessaris, ad eius conservationem; nam nerbi principiu, & originem sorsiuntur à cerebro, arteriz à corde, & venz à iecore: queis ita explicatis, ve recte corporis Anathomiam assequamur á principali cerebri membro incipiamus, quia in omnibus semper à capite tanquam

quam'à superiore gubernatore, & Prælato est incipiendum.

SECTIO III.

De partibus componentibus caput.

Coput. Aput est pars corporis superior, in qua recidet facultas animalis cerebri, & rectrices Anima, componitur ex partibus continentibus, & contenta tinentes dicimus, qua alias continent, & contenta qua ab alijs continentur, vt facilius componentes externas, & internas partes apellemus.

Partes continentes sunt quinque, scilicet, cutis ementes. adeps, membrana carnossa, pericraneum, & craneum; cutis vel est non vera, & dicitur epyder mermis, quæex super sluitatibus veræ cutis generatur, vel est vera, quæ dicitur dermis generata ex substantia rariori, & porossa, cui accedunt venæ capillares arteriæ, & ramusculi aliqui nerborum, & est tempe-

rata in complexione, & sensatione, deservitque, vt honeste vniverssum corpus sircunvestiat.

Membra: Membrana carnossa est tela 1. a quædam ex substantia media genita, inter membranossam, & carnossam substantiam, composita ex carne, & sibris,
Constansque venis, nervis, & arterijs; hæc igitur interius sircunvestit, vniversum corpus, vt eius vicera
ab aliquibus alterationibus defendat, & est in complexione similiter temperata.

Adept. Adeps est quasi oleum coagulatum genitum ex

craciori sanguinis parte recepti in membris frigidis; & ideo incalidioribus partibus minus generatur pin guedinis, distenditur, in partibus nerbiossis, vt humectando, conservet prædictarum partium calorem naturalem; caret sensatione, & motu ita Gallen. lib. 1. de temperament. cap. 1.

Pericraneum est tela quadam nerviossa, crasior, perieradensiorque, qua ossa capitis sircunvolbit, & muscu-neum. los temporales vincet, ac tegit, originem habet à tela; qua dicitur dura Mater, & est in complexione fri-

gida, & sica.

Craneum sumitur protota capitis sircum volutione, & componitur ex octo offibus, quor u primum dicitur os coronale; duo pariettalia, que ita dicuntur, quia sunt, quasi duo parietes, & ingeruntur in vno & altero latere, in coronali: duo petrossa, quæ sunt otto sue extra aures, talia dicuntur, quia duriora sunt, & qua-ofa capi. si petræ; sextum occipitale dicitur, & est in poste-tise riori parte capitis, & cum offe vacilari vnitur (quod apud vulgum dicitur cerebrum, & nuca apud alios) Vltimum dicitur os cribosum ad similitudinem cribri habentis duo foramina, aut meatus quibus aqua, aut licor instilatur, & est in anteriori parte capitis, exquonares eformantur, habetque duo foramina, vnum ad dexterum latus, alterum ad finistrum, quæ dicuntur collatoria, quibus cerebrum expurgatur, & suffumigia, & herrygnum, & reliqua olfactoria amplicantur. Olla

Commis-Sura.

Ossa igitur hæc crancum componentia vniuntur interse medijs quinque commissuris, quæ idem sonant ac iuncturæ, quarum prima dicitur sagitalis inmedio frontis, ad similitudinem sagitæ; alia ceronalis, & occipitalis alia hæ igitur dicuntur veræ commissurz; ad distinctionem aliarum, quæ dicuntur non veræ, vt sunt duæaliæ commissuræ, quæin ossibus petrossis reperiuntur.

Hæigitur commissuræ magnas habent vtilitates comfetes, & prima est vt telæ internæ, quæ dicuntur dura surarum. Mater, & pia Mater, pendulæsint, & quasi cerebri cortine nitantur à beis; secunda est, vtembrochia, oxyrrodinium, & irrigationes, per istas commissaras ad interna cerebri vicera communicentur. Tertia vt cerebrum expurgetur. Quarta, vt contusso aut fracto vno osse, aliud incolume remaneat; nan si aliç aliefunt viilitates, magis in experientia patebunt.

SECTIO IIII. De partibus internis, sive contentis.

DArtes igitur contentæ sunt sex. 12. Dicitur dura Mater. 2.ª Pia Mater, 3.ª Substantia Medularis. 4. Ræcte admirabi is, 5. Grandula, quæ recipit cerebri pituitam, & vltima sunt septem nerborum paria de quibus seorsim breviter agendum est, & ideo in primis.

Dura Mater est tela quadam crasior, & nerviosfill b

fa, quæ sircundar piam Matrem, & substantiam medullarem cerebri, & est contigua, & quasi vnita, cum
ossibus craneum componentibus. Pia Mater; est
telatenuis, & subtilis infra duram Matrem contenta Pia Maveni, & arterijs vnde quaque contexta: venæ igitur,
vt alimentum cerebro necessarium deserant, vt renutriantur eius partes; arteriæ trahunt spiritus vitales, vt ex ipsis siant spiritus animales; vtraque igitur
tela, est quasi cortina, sive involucrum, tegumen, aut
cooperimentum substantiæ medularis cerebri, de

qua iam sermonem facimus.

Substantia medularis; est substantia, quadam al-medulaba, mollis, & lems, qua totam cerebri cauitatem re-ris. plet, & est vasis, seu fundamentumin quo residet ipfa animalis facultas; hacigitur tres habet ventriculos; in quibus facultates rectrices nituntur, in anteriori parte; primus est, in quo adest phantasia, seu imaginatio; secundus igitur, qui in medio capitis fitum habet, residet extimatiba, ratiocinatio, seu discurlus, in polteriori parce, terrius est ventriculus, in quo memoria, seu reminiscentia dicitut exoriri: nam licet, in aliquorum sententia maior sit facultatum recinicum numerus; tantum denominative, & per sinonoma distingui dicimus, quia ex Galleno lib de facultatibus naturalibus cap. 7. & lib. 1. de symphtomatu causis, & 6. de locis affectis cap. 8. has tres alignat; logici vero, & me haph cici, vipreficiones, & vniversale constituat, & species impressas aprehendant, E [] 3

retineantque, quinque defendut facultates, scilicet,, sensum comunem, seu imaginationem, phantasiam, rationem, seu intellectum agentem, discursum, &: memoriam, seu reminiscentiam, inqua servatur species idolorum, sed ipsi de his examen faciant; dum. nos ad alia tranfimus vtilia.

Rete admirabile est plexum quoddam, ex arterijs soporalibus mirabiliter in cerebro ad similitudinem. retis contextum: dicituradmirabile ratione curiositatis, qua tegitur; alij dicunt esse rete admirandum ratione vissus perspicatissimi, qui requirituradi huius retis cognitioneme ita Fragotius lib. de Anathomia cap, proprio de cerebri compositione, Calbus, & alij.

Glandula, quæ pituitam cerebri recipit, est pars, quædam durior, & citum, habet supra os bacilare, & habet vnum ventriculum, sive foramen, in quo suscipit pituită cerebri, vt ipsam evaquet natura, per pallatum: ita Antonius Laurentius lib. Anathomiæc. 3. Septem igitur nerbiorum paria originem sor-

tiuntur à cerebro, tanquam à radice, & fonte sensus, & motus: Primum par defert spiritus visivos ad ocu-E. Pan los, per propias cavitates, & hocinteligitur de nerbis obticis, inquibus enim, si detur obstructio privabitur vissus, veluti in gutta serena propter spasmum; vel insufusione propter humor is pituitosi excrementitij portionem; qui intunicis oculorum densatur.

Par.

Par secundum, accedit ad musculos oculorum, Par. 2. & supercilia.3. M Ad frontem, ad musculos tempora-3. Pari les, ad molas, & detes. 4. M Ad singua devenit in quo facultas, sive sensus gustus recidit, & deinde totum ramificat pallatum: exquo audebant aliqui Authores dicere gustus sensum in pallato esse, & nalibi.5. M y. Par. Par adaures, & inquolibet nerbo adest virtus audiedi, quo refrigerato, vel instamato, vel quovis aliomo do distemperato, læditur ipsa audiendi facultas: hi duo nerbi gingibas, & mandibulas, similiter ramificcat.

Par sextum decendit cumrecto ordine, &tra-Par. 6. mite, ad duas cabitates, vitalem scilicet, & naturalem, ita, vt intrachi arteria vniantur: hi duo neibi, ve deinde quisque descédat per proprium latus, dexter per dexteram partem finister per sinistram; deinde iteram inore ventriculiingerutur, & aliquos ibi generant ramulculos, quibus totus venter contegiturs & postea descendit, & iecur ramificat lienem, renes, vencam fellis, matricem (in mulieribus) vrinæ veficam, & omnes partes inferioris cavitatis naturalisa ex dictis statim advertite: caufam ob quam, fiquis contustione succipiat in ore ventriculi, vel vulnus ob mutelcat, & fine motu, & sensu iaceat super terrains & sivulnus, vel contusso incerebro contigerichtatim vomitus bilis supervenit, & locutionis privatio; propter nerborum d'Aorum confesium.

Par 7. mAd linguam deveninad mindibulam in. Par 7.

feriorem, & orcipitium, & similiter linguæ musculos ramificat, ac movet: ita Calbus liber de Anathomia cap. 39. Andreas Laurentius lib. 4. cap. 16. de Anathomia.

SECTIO V. De partibus saciem componentibus.

C'Unt igitur partes faciem componentes in seprenario numero collocaræ, scilicet, oculi, supersilia, tempora, frons; nares; os, & auriculæ: de quibus leorsim agedum erit, & ideo circa primam partem.

Oculi: sunt partes, composita ex venis, Farterijs, nervis, & musculis, tellis, & humoribus in quibus; facultas visiva recidet, & species impressa constitui-Tunicari tursoculorum tunica lant fex. 1.ª Qua eft adextras

dicitur adnata alba, & subtilis; oritur ex pericraneo

capitis, & in sirculo maiori fridis finitur.

Secunda dicitur secundina, que formatur ex extremis partibus murium oculos moventium; & in iride similiter finitur. 3,4 Dicitur cornea, ex qua for-3. matur oculus, & sircunvolvitur, & est alba, durior, & splendida, adextra; ad intra vero, nonita, nascitel ex dura Matre.

4.2 Dicitur vhea, qua exijt à pia Matre, Ginobtico nerbo involuitur. 5.4 Retinea appellatur, qua ex ipso metobtico nerbo exoritur. 6,2 Tunica Aranea: denominatur ad similitudinem arancorum tela.

G'ex pia Matre ducit originem: similiter oculus Tresocu. extriplici humore componitur, & organizatur, scili- lorum hue cet, ex albugineo, chrystalino, & vinco. 3 25 18 1865

Albugineus humor, est pars ex substantia rara, Albugiveluti albumen ovi : & est in maiori quatitate, quamineus. cateri humores; humor chrystalinus dicitur talis ad chrytasimilitudinem chrystali; ita vitreus humor, quia vitro linus. densato similimus est, talis appellatur; hic in intima Vicreus. oculi cavitate est coglobatus, supra huc, humor chry stalinus, & hic sircunscribitur ab humore albugineo:

Hic similiter invibitur in tunica adnata secundina, & cornea; chrystalinus intersecundinam, & cormeam: vitreus inter corneam; & vbeam; qui ita commixti, & conglobatioculi figuram rotundam componunt: cavitas inqua servatur oculus orbita dicitur, & palpebra est quasi vicera, que ipsum defendit ab omhi externa alteratione: quæis politis, vt certum, & luce parentius defendite: facultatem videndi in humore chrystalino constitui; alia quam plurima sese offerebant in præsenti, quævssu, & tempore studiosso parebunt.

Supercilia supra oculos suntita à natura dispo-lia. sita ad eorum pulch ritudinem ; tempora, ad exornationem, & compositionem faciei, sicuti frons : & Na- Fros Na. res: sun cerebri expugatoria, per quas humor pituito-res, cos. sus, & excrementitius expurgatur, & odorum qualitates deferuntur ad instrumentum olfatus sistens su-

pra os cribro fum. en la

Osest pars, sive ianua per quam alimenta deseruntur, ac masticantur, & aliquo modo digeruntur: constat ex pallato, columela (vulgo campanilla) epiglotide, quæ est quasi covertera, sive cooperimetum, sive tegumen guturis, & orisicij trachiarteriæ: aures sunt instrumeta auditus, emungatoria cer ebri & ornamenta vultus, inquarum cavitatibus adest sensorium duplex, vnum quasi incus, & aliud quassi malleolus, in quibus sonus percipitur, & facultas audiedi celebratur, & surditas symphtoma supervenit.

Callans.

Collum componitur extrachiarteria, sive meringe (vulgonues) ex venis organicis, arterijs magnis cuius citus, & figura omnibus luce patentior est; ideoque ad alia progrediamur.

De continentibus, & contentis pectoris.

PEctus dicitur pars, sive planities anterior, incipiens à atrachiarteria of que ad ombilicum: partes continentes sunt decem, scilicet, cutis, membrana carnossa, pinguedo, musculi inter costales, costa, vertebra, sive spondilia, omoplata, clavicula, esexternon, & pleura.

Musculi inter costales sunt inter costas vniti, & contexti, deserviunt ad respirationem, comprimendo, & dilatando, vrinstrumentum respirationi subserviens, & innumero, apud omnes anathomes, trigin-

gint, & quatuor, inquolibet latere existunt.

Costæsunt viginti, quatuordecim dicutur veræ; inquolibet latere sunt septent; dicuntur veræ, quia in osse externone ingeruntur curbum, & circulum habent completum, reliquæ decem, dicuntur mendosse, sive salsæ, aut non veræ, quia non sont completæ, & nituntur in cartilaginibus, & vniuntur medijs musculis inter costalibus; sunt igitur informaticus, vr partes internæ dilatentur; & custodiantur abeis

Spondilia, aut vertebræ, offa sint, quæ totam spi-spēdilia, nam componunt, & sunt in numero trigessimo quarto, septem in collo, duodecim in pectore (scilitet po-offa spinam som special) sex in lumbis, quinque in osse sacro, & qua-ponentia tor incauda ossis; deserviunt, vt corpus sit rectum, sunt 34 & sursum, & deorsum moveatur; vniuntur interse medijs ligamentis, & sunt ossa duriora, & intus continent humorem quo humida conservantur namaliter à motu sacile siccarentur, habet similiter Exassum quodlibet os duo orificia, vnum indextero latere, al. sacrus societum que in sinistro, ex quibus exceunt sexaginta notum totius corporis per participationem facultatis cerebri.

Omoplatæ; sunt partes ex quibus totæ componuntur scapulæ, sunt xivatæ ad extra, & concavç ad-14. intra, admodum testudinis, sunt ergo scutum partium posteriorum; os exter non est in parte pectoris anteriori, & durissimum, & dentius proter cordis, & pulmonu custodiam sita Galbusin sua Anathomia, Andreas Laurentius, tractatu de osibus sol. 85. Versalius, & alij sin inferiori parte huius osis adest pars, queda cartilaginossa, que dicitur apud vulgum obtetricum paletilla, & est proter oris ventriculi vicinitatemita mollior.

Clavicu- Claviculæ ossa quadam sunt in quibus nituntur brachia; nanaliter cederent. & lebari non possent; deserviunt, vt ossa scapullæ cum pectoris ossibus Pleura: vniantur; pleura tela quadamest, qua ad intra costas sircundat subtilis, & nerbiossa: principium habeta vertebris pectoris, & in osse externone finitur, & dividit pattem dexteram à sinistra, & é centra, vt morbus in vno latere, non facile alteri comunicetur.

SECTIO VII. De partibus pectoris contentis.

PArtes contêtæ sunt decem, scilicet, pericardium, cor, palmo, trachiarteria, gula, sive essophagus, so. Alteria magna, vena cava, vena sine consortio (offigos dicta) mediastina, diastragma.

De his seorsim opere prætium duxi pertractare;

clare, & aperte, quod non sacile iudicadum, eo quod sint interna, vicera, partes in essentia cognitu distiliores, cum no ita secuti alia præmanibus habeantur, & ideo circa pericardij explicationem stulto-

res varietate vtűtur, vt videre licet apud Fragolium, sapietissimum Hidalgum, capite de pericardij Anathomia: nos autem doctissimum Andream Laurentium sequimur libro 9. cap. 9. sol. 671. V bi ita scribit: cor viscus nobilissimum, membrana involuit, quam gręci pericardium vocant, latini involucrum apud Hyppoccrat. & Aristotelem vaginam cor-

dis appellant.

ideoque sic definiri potest pericardium: est in-Desinirio volucrum quoddă, ex substantia membranosa, humo-perisar rem sero, persimilem circum voluens, inquo cor movetur, eius calor, astus a temperatur: habet principium à membranis venz cavz arteriosz, arteriz, magnz, arteriz venosz, communicatur diaphragmati, mediastinis, pulmoni; quinque habet pulmo riscia; vnum venz cavz, per quod intrat, alterum habet ario per quod exit: duo similiter arteriz magnz, per sia. quod exit vnum, alterum per quod intrat, arteriz venalis quintum, per quod intrat.

Cor membrum est principale, vita fons inque artificiossus ille Senonis ignis continentur, Erinquo hic divinus, ac calestis calor tegitur, quem Prometheum, é cœlo furatum singunt antiqui Poere in profanis literis. (non quidem sponte) resinquo quam plurima decorde curiossora propter brevitatem in tractatu vobis promissam, & ideo eius desi-

nitionem auscultate.

Corest membrum princeps in medio toracis collo-cordis de Catum ficiale.

catum, fons, & origo caloris naturalis, & spirituum vitalium,in quo vitalis facultas residet, qua per arterias vniverso corpori comunicatur: optima definitio, vtperse patet; cor igitur duos habet ventriculos, vou in dextero; alterum in sinistro latere: indextero copia sanguinis invenitur ratione venz cavz, in sini-Aro copia maior spirituum ratione arteriæ magnæ, vt doctissimus Doctor Vallesius asserit lib. 3. contr. an cor, & arterie simulattollantur, ac comprimatur? Vbi advertite quod cuspides venæ cavæ in dextero, & in sinistro magnæ arteriæ, apud nos dicuntur cordis auriculæ; apud vulgum enim (alas del coraçon) & sunt partes cartilaginola, in quibus nituntur ateria magna, & cava vena. monov mnoma is estre

· 医生产等温度

Pulmonis Pulmo est tela quadam expongiosa mollis subdefinisio. stantia, & alvicantis, intemperamento calida, & humida, in medio toracis, aut cavitate ip sius collocata. Ita Gal. libiz. musculorum cap. 6. Fragosius lib. 1. de Anathomia cap. 27. fol. 28. Antonius Lauretius lib.9. de organis vitalibus cap. 12. & alij; consensum haberimmediatum cu pectore, pelura, & eius vicinis.

> Trachjarteria estinstrumentum respirationis per quodaerintramittiturin respiratione, & extrapellitur in inspiratione; componitur ex particulis cartilaginofis admodum litera C, & C, & C, vulgo dicitur gurgulion (idest guargnero) estque instrumentum principale vocis. The transfer of the second service is

Efo-

Esophagus, sive gula, aut gutur est tela quadanne sophaner viosa, per quam cibus, & potas vsque ad stomas autur, chum fertur, media dilatatione, & comprassione ipsius; incipit à trachiarteria cum qua habet immediationem, nan vnita est ipsi meringini, & descendit iuxta spondilia, vsque adstomachum.

Diaphragma, sive septū transversum est tela qua Diastraga dam musculosa, & nerviosa, rotunda, & subtilis, ma desiqua dividit cavitalem vitalem à naturali, & seccat, & nitur. prascindit corpus per mediü, est que supra ombilicum, & immediationem cum cerebro ratione sexti paris nerborum cum quibus tegitur, cum viraque pleura, esophago, & pulmone; suit igitur à natura ordinatum propter tria munera; primum, vi sit instrumentum principale respirationis, cuius motus est voluntarius, partim, & partim naturalis; secundum, vi suo motu depelleret excrementa intestinorum, quia aliter non descenderent; tertium, vi divideret regionem naturalem à vitali.

Arteria magna est vas, quod quasi d sinistro cor-magna, dis ventriculo exit, & totum corpus ramiscat; in cuius cavitate sanguis arterialis, & spiritus vitales continentur, quos vniverso corpori suggestit.

Vena cava: est similiter vas maius sanguinis; eri- Vena cagitur ex hepate taquam à trunco, aut radice, & san-va. guinem præbet vniverso corpori, vt satis sam supra explicatum remanet; ideoque neutiquam immore-

C2

mul

mur. Vena offigos, aut fine confortio est; quæ infra consursum per spondilia, ob repit, & intracostam, & co ftam, & vertebiam, & vertebram , quafi anguis ramnificat ipsasola, & deffert alimentum, & est ramus venæ cavæ, vt satis patet.

Mediastina, sunt extremitates verinsque pleuræ Medieftirebolutæ, quæ finiuntur in offe externone, & funt einfdem rationis, & temperamenti cum ipsa pleura.

SECTIO VIII. Et vltima. De partibus componentibus ventrem.

/ Enter vsurpatur pro tota naturali regione, quæ incipitab vmbilico víque ad pectinem; componitur similiter ex partibus continentibus, & concotinetes tentis; continentes sunt decem; scilicet, cutis membrana carnossa, adeps; addomen, peritoneum omentum; coste falla; aut non vera; spondilia (sistentia inlumbis) os facrum, & pecten.

Fartes.

Bentris

Detribus primis satis iam supra remanet expli-Addoni- catum. Addomen est pars composita ex nerbis, musculis, & fibris, rectis, transversis, Sobliquis, vt atrahat reineat, atque expellat, eltque quasi crassa tela que contigua est cum peritoneo, & in hac contiguitate fit congregatio aque, aut humoris cerofi in hidropicis.

Peritoneum (sive si phac agracis) est tela quadam fortior, qua omentum circundat; duo habet

Partes so

tentain

Vetre 30.

orificia per quæ tranceunt vassa seminalia ad dindimos, seu testitulos; de costis, & vertebris supra iam egimus.

Os sacrum tale dicitur à magnitudine in ali-os sacru. quorum placito, non quia aliquid sacri in eo reperiatur, sed quia ita est receptum, vitimo spondili vnitur,&cum offibus illeonibus annectitur;os illeon eft illud in quo pixidatur, aut incastratur os femur hoc est (à donde encaja el huesso de la pierna.)

Os pubes, sive pecten estos medium interilleonica offa collocatum, & ipsis vnitum; in eo que verende partes alligantur, & propter nimiam humiditatem pillosam cutim habet. Partes vero ventris contentæ in numero viginti circunfcribuntur,& fequenti ordine annotantur de quibus seorsim agendum erit.

1. Omentum

2. Mefentereon

3. Intestina

4. Stomachus

5. Lien 6. He par

7. Renes:

8. Vesica fellis

9. Vrine vefica

10 Venacava.

II. Arteriamagna

12. Venaporta 13. Pancrea

14. Venæ vreteræ

15. Vassa seminalia 16. Emunctoria

17. Testiculi

18. Matrix infaminis

19. Venæ emulaentes 20. Vena miseratue

Omentuin vulgo (el redaño) est tela subtilis, & ommenperitonei, & abdominis tela tenuior, constans venis, tum. arterifs, & nervisintestina, & stomachum admodum faculi involvens: incipir ab stomacho, & finitur circa vmbivmbilicum, circa quem maximam habet pinguedinem qua coctiones iubat, & est admodum partium minutarum, velutiglandul; de quibus Hyp. mentionem fecit 2. aphor. 35. per hæc verba: in quovis morbo partes ad vmbilicum, & imum ventrem attinentes crassitudinem habere melius est: multum vero externari, ac contabes cere pravum, sed & hoc quoque ad inferiores purgationes periculosum: in cuius textus commento videndus est Gal. dum nos ad alia transsimus.

Mesereo, seu mesentereon est tela quadam dunior, & crassior pluribus venulis contexta, qua dicuntur messeraica, & ita nomen sortiuntur ratione situs, constatque mesereon glandulosis, ac pinguedinosis partibus ineo pendulis, & alligatis ad similitudininem, & magnitudinem nucum, & castaneatū,& ha pancrea appellantur. Vane messeraica sunt
seraica.

Vena me-illa per quarum, cavitates chylus in parenchima hepatis desertur; sunt angustissima, & instra stomachum situata, vt dictum est in medio meserci.

Hepar: Hepar; sive iecur est membrum principale, in dexterolatere collocatum, principium, & origo massa sanguinaria, qua vniverso corpori per venas, vt nutriunicatur: est igitur intemperameto calido, & humedo; vocatur à Gal. per Anthonomatyam lib. de humoribus sanguis coagullatus: dixi in difinitione principium, & origo massa sanguenaria, vt notetis omnes humores à iecore pro-

· Lang.

duci, & non ab alia corporis parte, media causa efficiente, seu facultate in eo radicata, & congenita, que dicitur naturalis: an hoc siat multiplici, vel vnica actione? Intractatu de humoribus videre potestis.

Habet duplicem tunicam, vnam quam sucipit ex peritoneo, alteramque propriam, quæ dicitur involucrum; pars ergo superior hepatis dicitur giba rotione siguræ, & pars inferior dicitur cava ratione siguræ cavæ, ex hac parte oritur vena cava, & vena porta ex hiba, alligatur dextre pleure, septo transverso, gurgulioni, & vsque ad stomachum extenditur, vt i psum calefaciat, & coctionem prima iubeat, & similiter cosensum habet cum his, & vicinis partibus.

Vesicasellis, est vas, & receptaculum bilis sla-verseaz va ex magnitudine, & sigura piri ex substantia ner-sellis. viosa composita; constat ex duplici tunica, vna propria interna, & duriore, alteraque ex peritoneo recepta; componitur similiter ex triplici genere sibrarum, qua dicuntur recta, vt atrahat; transversa, vt retineat; obliqua, vt expellat; munus principale huius vesica; est sanguine purificare, bilem à se alicere per venam vnicam, & per aliam, portionem emittit ad intestinum duodenum, vt calefaciat sundum ventriculi, & exsiccet, & exinde appenitus sitis excitetur: sinis alius est, vt excrementa rapiat, ac detrudat natura per intestina; vbi advertite quod si maior portio bilis ad venerit plus, quam ratio postulat, sit tunc sympthoma in exiente mutato, quod apud

apud vulgum medicorum dicitur colera morbus, & si venula hæc obstruatur, per quam deffertur sacit morbu regium, sive icteritiam, quia sel per totu disfunditur corpus, vt communis Doctoru sert opinio.

Stomacus

Sromachus, sive ventriculus, sic essentialiter desiniri potest est pars princeps receptaculum cibi, & potus principium, & origo materia chylosse per venam portamin hepatis parenchima dellata, ex qua consicitur massa sanguinaria vniverso corpori necessaria, inqua definitione potestis particula illam, pars princeps, interprætari, quoad vsium, non vero, quoad originem, si non vultis desendere, partes principes qua-

tuor esse, aut problematice, &c.

Vbi advertite: quod inveetriculo debemus confiderare tres partes; scilicet, parte superiorem, partem inferiorem, & totam cavitatem ipsius; pars superior, quæ dicitur os ventriculi; est acutissimi sensus propter nerborum par, quod ex sexta coniugatione descendit à cerebro, & ibi implantatur, & cum hæc pars inslamatur superior dicitur cardiargia, sive cordis argia, autangor, & ratio est: quia cordis pars inferior est ori ventriculi proximior, & ob hanc rationem seguitor hoc symphtoma, animi deliquium, & alia accidentia gravirora, vt constat ex Hip. lib. 5. aphor. tex. 65. In febribus circa ventriculum vehemens æstus, & cardiamos malum.

Parsigitur inferior, dicitur apud græcos pyloron, & est oristium illud, per quod exit matria vhy-

lolla

lossa, ad venam portam, & deinde descendit, act termuia intestina, vi magis perficiatur, & transeat ad hepatis parenchima per venas meleraicas; por test hac pars obstrui, & dolore affici?

Pars igitur media, live cavitas ventriculi funt ipfa membrana ventriculum componentes, & si dolor ipsis super venerit considerare oportet an affatitibus siat ipsas membranas distendentibus, & continui solutionem inducentibus, vel ab intemperie nuda, vel an ab ipsa cum affuxu humoris, de quo videndus est Gal. lib. 11 Method. cap. 112.83. &c. Nan
hoc valde conducit ad rectam ventriculi curatione.

Lien, est pars spongios a, & vara in senstro costa-Lien.

rum latere collocata: carens sensu. & motu, teceptaculum humoris melancholici, quem suscipit ab hepate pervenam ad hoc munus destinatam; & ex hoc humore nutritur, & in temperameto humocorrespondet humori frigido, & sicco.

Intastina sunt instrumenta in quibus, recipitur Imersematura excrementum: sunt pariter nerviossa, & exttriplici tunica componuntur. 1., dicitut intesior;
& est nerviossa, & rugossa proprer dilatationem, &
compræssionem 2., dicitur propria 3. acquista,
& communicata aperitoneo; intestina dicuntur sex,
non quia divitionem partiantur, sed ratione rebolutionum sex, quia revera vnum est intestinum, sed
tamen comunem insequendo opinionem. 1. m. Vo-1. Duode,
catur duodenum, quia constat ex duodecim digitis.

2.m Dicitur ieiunium, quiaibi parum chylimmora-2. Teinnium. tur, & asedne vacuumest. 3. " Dicitur illeon, quia in eo fit illyaca patio; quartum appellatur excum quia habet vnum orificium parvum, & angustum, vt ibi detineatur chylus, magilque perficiatur, & ex in-4. Cecum. de per venas meseraicas transeat ad hepar. 5. m Co lon appellatur, quia ibi dolor colicus generatur; incipit in infima parte hepatis, & finitur circa re-3. Colon. nem sinistri lateris, & ex inde incipit vltimum intestinum, quod nuncupatur rectum, à rectitudine ipsius,quia in osse sacro incipit, & in musculo ex phynteri anni finitur. de recta na respensa pani mbao e e lav aora Vena ca- Vena cava iam supra satis remanet explicata; venæ vero emulgentes tales dicuntur, quia sugunt Vena cerum humorum, & ipsum ad renes mittunt, vt deemulgeninde ad vreteras, & vique ad vesicam vrinæ. zes. Renes:partes funt solida, & carnosa rotumda: circa spondilia, & tardi sensus, constant duplici tunica, vna propria, & altera ex peritoneo, & cum venis, & arterijs conteguntur; vnus est in dextero late-

tera. Vefica Prine.

in vesicam; sunt dux: vna indextero, & altera in sinistro latere interinguina. Vesica vrina, est pars instrumëtalis, membranosa, vrina receptaculum, supra intestinum rectum, & pectinem situata, extemperamento frigido; & ficco; constat triplici tunica nerviosa duplici propria, & altera acquisita, & co-

re, & alter in finistro, supra os sacrum.

Vena vre Venæ vreteræ; funt vassa perquæ defertur vrina

municata à peritoneo; componitur similiter ex triplicigenere fibrarum, scilicetex rectis, vt atrahat: trasversis, vt retineat, & obliquis, vt expellat.

Arteria magna iam supra remanet explanata Arteria satisque definita, & ideo ad alia transgredia - magna. mur. Vassa seminalia sunt venæ in quibus semen vasa seelaboratur, coquitur, & perficitur, & defertur minalia. ad dindimos, aut testes inquibus de albatur, & parificatur per vlteriorem coctonem: vassa seminalia sunt duo, vnum in dextero latere, quodoriginem habetà vena cava, alterum in sinistro, habens principium a vena emulgete, & quodliber ingeriturin medio spatij cum atteriæ magnæ ramulo ad modum forcipis.

Testiculi sunt partes principes ad speciei propagationem; compositæ ex venis, arterijs, & nervis ex Texta coniugatione, ex substătia alba, solida, & ad similitudinem filamentorum constipata; habent duplicem tunicam, vnam interiorem, alteram acquisttam à peritoneo, in téperameto sunt calidi, ineisque ad est magna spirituum copia roborans vniversum corpus; similiter qua plurimas habet vtilitates, quas relinquo temporis brevitate, & quia eis studebitis.

Matrix, seu vterus, aut vulba, quod idem sonat est pars essentialis ad speciei propagationem, situm ha-Matriz. bet infra vesicam vrinæ, & supra rectum intestinum; ibique generatur homo inter sordities, & in locostercoris, vt consideret suum principium, &'ne supervia deseptus obliviscatur sui originis: est igitur

D2

matrix

matrix pars ex permatica nerbiofa, & rugosa contextura; intemperamento calida, & humida in osse sacro alligatur; ideoque ibicum maxima ratione medicamenta copica applicantur; constat extriplici genere sibrarum, rectis, transversis, & obliquis, ve atrahat retineat, & expellar, ita sunte munera ipsius, ve non possim pro brevitate ea explanare, & ideovlterius ad alia progrediamur.

Venæ emulgentes sunt illæ quæ sugunt homorum venæ eferum, & aiccore vsque ad renes atrahunt, vt deinmulgetes, de ad vesicam per vreteras defferatur. Venæ mesvenæmi-soraicæ sunt illæ per quas chylus deffertur ad parenseraica. chima he patis, vt exipso siant humores: sunt igitur
angustissimæ, & contextæ, ex quibus componitur
mesereon quodsupra iam satis manet explicatum.

His ergo iactis, tota apparer corporis humanianathomia perfecta, & totius hominis vltimo confiructa compages, & fi admirabilis huius armonia desideratis, certum determinatum que ossum, & musculorum numerum, in seripto hispanico nvenietis sermone.

relingno er appañs beceffighe, se quel el és sa leblés. Marrie, leu vance, aut maba a combétent first e el francelles del final formant el francelles de la first

ริสารสาครับโรยใหม่เลือนกล้าเกลาสารสารสารสารสารสารสา

or partition and the beautiful at the con-

en il mondionini, mant ambini pri di matali no pri di matali no pri di matali di di T_2 RAC_2

il. Al han Bizz

TRACTATVS vnicus de Partibus.

SECTIO I. Quomodo accipiatur pars, quomodo que; definiatur, atque dividiatur?

lcet autem (STVDIOSI GRAVISSIMI)
alia quam plurima impræsenti circa corporis humani fabricam eius armoniam
aduci poteram, attamen quia brevitatem
desidero, circa magis essentialia percurram, non
verba conterendo, sed vobis operibus deserviendo.
& ideo

non de alijs. V nde etiam varie definitur pars ab Authoribus, vt constat ex Aviscena sen. 1. 1. doctr. 5. cap. 1. asserbe : pars est corpus ex prima humorum permixtione genitum, vt humores, qui constant expermixtione ciborum, & cibi ex elementis. Quæ definitio potius materiam, quam naturam essentialem partium explicat. V nde nos in præsenti, essentiam, nomenque partis cossideramus, in ordine ad totum vivens, quatenus deservit ad eius sunctiones, & morbo potest àffici, & capax est sanitatis; & ideo reiectis alijs definitionibus, sic proprie, & essentiali-

ter pars definitur:

Pars, siveportio: est corpus toti coherens; communi etiam vita coniunctum, ad illius sunctionem, & vsum comparatum. Quæ definitio, vt optima, & essentialis admitenda est. Primo, quia obtime essentiam partis per primarium conceptum in vsu medicoexplicat. Secundo, quia secundum Summullarum regulas: definitio, quæ explicat essentiam definiti per verum genus, veramque differentiam, vt optima est amplexanda; sed talis præsens: ergo minor probatur discurrendo per singula definitionis, nam ly corpus, loco generis ponitur reliqua vero loco differentia, vt magis in subsequenti patebit: ergo; dicta definitio tradditur per verum genus, & differentiam; item quia non est citra Gli. placitum, vt constat ex Sapientissimo Doctie Mercato, sitati tracat. de part. 6.

Vnde

Vnde in primis dividitur pars'in similarem, & dissimilarem, similaris, quæ dicitur 1.3 Omogenea, & simplex, est corpus cuius partes habent eandem definitionem, & nomen cum toto; huiusmodi sunt (ex Gal. doctr.) cutis, Membrana, Adeps, Fibra, Tendo, Caro, Os, Cartilago, Ligamentum, & sique alie sunt huiusmodi.

Dissimilaris autem, quæ dicitur. 2.2 Etherogenea, Composita, & instrumentalis: est corpus cuius partes non habent eandem desintuonem, & nomen cum toto. Vt Caput, Pes, & Manus, &c. Quia quælilibet pars manus, non est, manus, sicut quælibet pars adipis, est adeps. Sed circa venas, & Arterias, & nerbos, valde est dicidium inter Authores Medicos, an sint partes similares, vel instrumetales? pro cuius resolutione.

Dico.1. cum D.e Vallessio: lib. 2. Controv. c. 1. Concluso Vena, & Arteria, & Nerbisum partes instrumentales. Probatur 1. ex Gil. lib. 1. Method. cap. 6. dicente: Instrumentum appello animalis partem, qua perfectam operationemedere potest, vt oculus visso, nem, lingua loquelam, adeundem modum, & vena, arteria, & nerbus, tum instrumenta, tum animalis partes sunt: ergo expresse ex Gal. vena, arteria, & nerbis sunt partes instrumentales, & ratione.

Probatur, quia illæ partes, quæ constant diverfis, substantijs in compositione, non sunt simplices, sed instrumentales; sed venæ arteriæ, & nerbi con-

stanz

stant diversis substansijs in copositione g.venz, arte riz, & nerbi non sunt simplices, sed instrumentales. Maior partet ex definitione partis, simplicis, & copositz. Minor probatur ex Gal. 1. Meth. cap. vltimo vbi inquit: triplicem substantiam venam habere, inembranosam, sibrosam, & cartilaginosam; sed ha partes sunt diversa in compositione: ergo venz, & arteriz constant diversis substantijs, & consequenter partes instrumentales, & non simplices debent dici. Sed contra dicta aliqua insurgunt argumenta, & ideo contra partis definicionem.

Argues 1. ex Gal. 1. de viu partium c. 1. vbi ita definivit partem: Pars est corpus quoddam, quod neque vondequaque circunscriptionem habet propriam, neque vondequaque, coniuncta est alijs: ergo non bene definitur à nobis cum hoc modo debeat essentialiter ex Galeno desiniri. Respondeo g. quod non intendit Galenus partis essentiam desinire cum hac sitin ordine ad operationes naturales, se l descriptionem facere de loco, & circumsptione partis respectu totius, quia hoc vondequaque semper est circumscriptum, pars vero potest non vondequaque circumscripti; vt digitus quia voitus est secundum voum extremum, & ideo sicinterpreto Galenum, idest, voluit etiam dicere: Pars non est vodequaque voita, neque vondequaque dissuncta.

Argues 2. In morte hominis dantur veræ paries fimplices, & infrumentales, sed inmorte hominis nulla

nulla datur actio vitalistergo particule definitionis, vita contictum, & c. non bene essentiam partis explicant. Respondeo breviter distinguendo maiorem; in morte hominis dantur partes simplices, & c; in consideratione medica; nego maiorem : inconsideratione physica, l. anothomiæ: concedo: quia nos partes respicimus semper, quatenus ad operationes deferviunt, quod etiam paret: quia in cadavere non dicuntur propriæpartes, vt instrumenta, quia non datur id respectu cuius instrumenta dicebantur; scilicet vita.

Argues 3. Intendens probare venas, & arterias non esse partes instrumentales, ex Gallen. 1. de Elementis c. 5. V bi ait: venas, & arterias esse partes simplices: ergo male asserimus, & contra Gal. Respod tamen cum ipsomet Gal. lib. de disser morborum. c.4. V bi asseri: dupliciter has partes considerari posse, scilicet quoad primum sensum, & quoad secundum sensum; primo modo partes simplices dici possunt venæ; & arteriæ, secundo modo partes dicuntur instrumentales, quia in hoc secundo sensu compositio harum partium extripliciconstat, substantia, sibrosa, scilicet, membranosa, & cartilaginosa. V nde cum hac solutione possumus ad omniarespondere argumenta: Ratione operationis, concedo; ratione compositionis nego.

· 1123

SECTIO II. V trum corporis partes smt aliqua specie substantiali diversæ?

CV M igitur in humano corpore partium varietas reperiatur, movetur dubium inter auctores Medicos, & Phylosophos interrogado: an hæ partes, quæ maxime inter se distant, vt cor, jecur, cerebrum, manus, pes, & c. distinguantur aliqua forma substatiali, & partiali, partialis dicitur quia parti inhæret substantialis, quia partem substantialiter abalia parte specificat, quod ex forma accidentali non potest dici, quia adhuc improprie accidentali non potest dici, quia adhuc improprie accidentali citur forma respectu materiæ, & partium, quia accidents non est actus primus persectivus materiæ. Vnde tenendum, & observandum est, quod partium citus sigura, magnitudo, & c. non dicuntur talia esse substantia, sed ab accidenti, & varia dispositione; quibus suppositis.

Cathefor.

Dico I. Humani corporis partes non distinguntur interse aliqua forma substantiali: ita D. Thom. I.p. q.75. art. 5. ad 3. defenditur à Sapientissimo D. Mercato lib. 1. de Partibus, art. 1. q. 101. & alijs Medicis, & Phylosophis, vt constat ex P. Ruvio, Suario, Spinola, & alijs contra Vallessium, & alios; &

Probatur 1. quia si partes corporisinter se distina

gue-

guerentur, maxime penes formas partiales substanriales: sed hæ formæ nen dantur g. nec partium corporis humani distictio; mait.vt certa supponitur min. inqua est disicultas suadetur; quia si darentur plures forme partiales, totum compositum esset ens peraccidens; sed hoc implicat: g. & quod dentur formæ partiales; maior probatur; quia ens per accidens est aggregatio plurium entium coplectorum; sed si darentur formæpartiales daretur talis aggregatio: g. totum esset ens per accidens; patet assumptum; quia omnis forma partialis per vos est forma substantialis; sed omnis forma substantialis sacit ens completum: g. si darentur plures formæpartiales, darentur plura entia completa.

Probatur 2. quia anima est actus corporis physici, organici,&c.sed si partes haberent formas, per quas distinguerentur, hoc non verificaretur de anima: g. non dantur, formæ, per quas corporis partes distinguantur inter se; minor suadetur; quia anima informaret partes totum componentes actuatas per formas partiales: g. anima tunc non esset actua corporis physici organici, & consequenter duplex forma substantialis esset naturaliter in eadem numero

parte materiæ, quod non est dicendum

HOO

Ex dictis infero, quod partes corporis distinguntur inter se penes varia accidentia, & dispositiones, quia anima rationalistota est in toto, & tota

izioseno a mandres infines i Ez ingoni il in-

inqualibet parte corporis, & ideo ad operationes diversas elliciendas non requiritur formapartialis, sed hæch illa dispositio, ita vesidaretur in pede, aut in digito eadem dispositio, quæ datur in ventriculo ad chylificandum, etiam in digito, anima chylificaret, assective, non essective, nec valet dici: g. l. omnes partes surt similares, l. omnes sunt instrumentales, aut Ætherogeneæ; quia sussicit diversum accidens, & dispositio ad hoc vt etiam distinguantur, vt. Petrus albus, & Paulus niger, reduplicative vt albus essectionialiter distinguitur, à Paulo nigro, Petrus albus. Sed contra.

Argues r. Ea que habent diversummomen, & desinitionem distinguntur inter se; sed corporis partees habent diversum nomen, & desinitionem: ergo à toto, & à se substantialiter distinguntur. Respod. dissinguendo maiorem: ea, que habent diversum nomen, & desinitionem distinguntur inter se, vel acteidentaliter, vel substantialiter: concedo maiorem: semper substantialiter; nego maiorem; quia Petrus albus, & Paulus niger, non solum numerice, sed etià accidentaliter, & non substantialiter distinguntur; ita, & partes penes accidentia varia distinguntur inter se, vt demostrat diversa sigura, citus, magnitudo, & temperies; attamen sorma substantialis in omnibus partibus vnica est, & non multiplex.

Argues. 2. Pars corporis potest separari à corpore, & tune non manet actu per formam totius erg. non est eadem specie, neque numero, siquidem vnitas provenitab vnitate sormæ. Respod quod pars ab corpore separata acquiritaliam sormam (cadaveta) ris scilicet,) & hoc non probat partes distingui interse substantialiter in compositione totius.

Nec dicas: quia diversas exercent operationes, & diversa munera, saciunt distingui in specie substantiali, quia actus distingunt potentias, qui quidem sunt forma; hocigirur non valet dici, quia operationum diversitas non provenità diversa forma, sed à diversa partis dispositione, quod etiam assidue in agentibus naturalibus videmus: vrignis lutum indurat, & excicat; & seram liquafacit, & humidam, & suluidam redit; & ita similiter in corpore humano pro varietate dispositionum vnum agens naturale, (forma scilicet substantialis totius,) plura, diversa simunera facit.

Vtrum partes principales corporis humani Int tres? an quatuor? plures ve?

Bservandum circa presentem quæstionem sequendo pars principalis est principium, & origo alicuius virtutis, quæ vniverso corpori est necessaria ad individui conservationem; quæ virtus per totum corpus communicatur per meatus, aut cavitates,

veluti sensus, & motus per nerbos in totum corpus, dilabitur, sanguis per venas, & calor, & spiritus vitales per arterias, ventriculus chylum per venas meceeraicas ad parenchima hepatis quo ad vsum; qua quidem virtutes ab aliquo corporis membro originem trahunt, veluti sensus, & motus à cerebro, incuius substantia nerbi inseruntur, veluti arteria in corde, & vena in hepate.

Vnde etiam principalis dicitur, quia alias principales ministrat, veluci pulmo ministrat cor, venæ jecur, arterizetiam cor, quia se habent vi conditio finequa non confequetur finis operis, scilicer communicatio, aeris necessarii per pulmonem ad plures fines, scilicet ad atemperandum calorem naturalem, ad spirituum generationem, ad vocis formationem, & ad fulligines cordis expellendas, five expurgandas, ve sentitur in introductione aeris frigidi per respirationem, & calidi per inspirationem; vnde hoc media pulmonis dilatatione, & compræssione, sive sit naturalis. 1. Voluntaria respiratio (de quo non disputo in præsenti) consequitur, qui quidem vsus dicitur principalis, & ideo, & pars ministrans dicitur principalis; quod autem quærimus est: an ventriculus debeat inter principales partes numerari?

Çösləfis.

Dico 1. Partes principes corporis humani inquaternario numero collocantur, quæ sunt ventriculus, hepar, cor, & cerebrum, & quia luce pa-

ten-

tentius est affertum respectu hepatis, cordis, &ce rebri, in corum probatione non immorem ur, quia nemo dabitat jecur esse principium sanguinis vniverso corpo ri nutrimenti; cor principium spirituu vitalium, & caloris naturalis, & cerebrum principium, & origo spirituum animalium, & sensus, & motus: ergo ha tres partes principes sunt. De ventriculo autem maior est discultas, quod ita.

Probatur I. ex doctrina Gal. lib. 11. Metho: cap.
15. per hæc verba: Precipue vero astringentibus, idest, roborantibus est vtendum, vbi injecur, ant ventriculum super vacuum prosluit, quando eprimoribus admodum hæ partes sunt, & munus suum obeat linipsis morbis necessum est, porro est non exiguum eorum opus quale que reliquarum partium, quibus illud negotium est, vt in quo nutriantur consiciant. Et prosequitur deinde; vt si neque in ventriculo prove alimentum suerit concoctum, neque in sanguinem injecinere mutatum: ergo ex his Galeni verbis clare, & maniseste constat ventriculum esse partem principem, vt patet ex illis verbis: Cum èprimoribus admodum hæ partes sunt. & c.

Ex eodem Gal. comprobatur c. citato circa finem voi inquit: Non enim ex his qua devoraverit quis, sed ex his qua in iam dictis visceribus confecerit alimentum toti corpori suppeditatur, atque ob hac nimeum impensius quam catera membra ventriculus, of jecur roborantia de siderant; ergo manifest ven-

librariade S. Francisa.

triculus ex Gal. doctr. inter partes principes est nu? merandus, & si dicatis hoc verum esse quoad vsum non vero quo ad originem, quia Gal.vtexeludat pul: monem respectu respirationis, os, respectu masticationis, & reliquas partes ministrantes, asserit verbailla: Non enim ex his qua deboraverit quis , sed ex his, qua in iam dictis visceribus, & c. ve notemus partes principes continere aliquam virtutem intrinsecamin visceribus communicandam suo effectui vniverso corpori necessario; quod in ore, neque in pulmone poreil verificari, quia non adest in iplis aliqua influentia in visceribus, sed tantummodo transtumpræbent quasi aliquid extrinsecum; sed essentiale ve quo, ve aplicatio causa l. medium ad finem, ve cognitio respectu boni, quod appetitur, vel transitus respectu termini ad quem.

Probatur 2. Ratione: quia pars princeps est illa que est principium, & origo alicuius virtutis, que viiverso corpori est necessaria, &c; sed ventriculus, &c. ergo; minor probatur, quia est principium chyli;

fed chylus est materia necessaria: ergo.

Nec dicas tempore indigentiz ex pituita sanguinem generari, & ex hoc sequi chylum non esse materiam simpliciter necessariam, quia si antecedenter pituita existens in venis non generaretur ex chylo, rogo, ex quo generaretur, an ex nihilo? ergo antecedenter necessario suit pituita genita excheso. Sed contra Arguesa. Hepar solum est pars prin-

ceps

ceps; ergo probarur antecedens: quia hepar alijs partibus materiam suppeditat, & ipsum non suppeditatur; ergo solum hepar est pars princeps. Resipondeo distinguendo antecedens probationis, sed hepar non supeditatur, in qualitate caloris influentis cordis, nego antecedens, in substantia, aut actione propria, concedo antecedens quia absque calore influente cordis non potest naturalis, hepatis operatin necactuari, necactuari, necactuari elicere operationem.

Argues 2. adversus vitimam partem conclusionis; ergo os est pars principes. Probatur consequentia: quia ideo ventriculus est pars princeps, quia prebet materiam necessariam vniverso corpori, sed per os transit alimentum, & in ipso primo per masticationem præparatur ad chylum: ergo os est pars prin

ceps ficut ventriculus. Thomag anna grandos: 31

Respondeo distinguendo maiorem probationis; ventriculus est pars princeps, quia præbet materia necessariam vniveso corpori, per actionem immanentem propriæ virtutis, concedo; per actionem transeuntem, & extrinsecam, nego; & eodem modo minorem distinguo; quod igitur de pulmone etia phylosophari potest, quia pulmo est pars princeps quo ad vsum, non vero ad originem.

Argues 3. Tot sunt partes principes, quot sunt facultates: sed facultates sunt tres (præter quatuor communes, quæ dicuntur ministrantes:)g. & partes principes; patet assumptum ex Gal. multis in so-

F

cis, & præcipue in lib. 1. Meth cap. 13. vbi tres partes principes annumerat, scilicer, jecur, cor, & cerebrum, quia jecur principium venarum per quas san guinem alijs partibus, prebet: cor virtutem suam per arterias, & cerebrum per nerbos: ergo partes sive mebra principalia in ternario numero collocantur.

Respondeo negando minorem, quia sicut dantur peculiares facultates in alijs tribus partibus etia datur in ventriculo quarta facultas, quæ peculiaris est in ipso ad chylisicandum; ad Galeni authoritate respondeo, quod etiam ventriculus habet anstractus per quos transit materia chylosa ad hepatis parenchima, vt patet in intestinis, & venis meseraicis: & in citato loco Galeni, ipse inter principes ventriculum annumerat, vt legenti patebit: nec valet dicere: tot sunt partes principes, quot sunt facultates; quia facultas videndi est in oculo: audiendi in auditu, & tamen oculus, & auditus non sunt partes principes.

Vtrum sanguis, spiritus, & reliqui bumores

mereantur nomen partis corporis?

A Dvertendum est r. circa quæstionem: quod pars proprie, & stricte, est corpus toti cohærens communi etiam vita coniunctum ad illius actionem, & vsum comparatum, vnde si sanguis pars corporis demominaretur, absque dubio coniunctus esset vita, &

ita informaretur actu primo corporis phylici, organici, vt nullam aliam diceret formam substantialem, præter ipsammet animam, & vniretur, & continuaretur eo modo, quo reliquæ partes corporis vniuntur.

Advertendum est L'quod aliud est dicere vitam à principio intrinseco per propriam emanationem, & aliud est esse instrumentum vitæ dicens per communicationem vitalitate, quasi ab extrinseco, quod autem dicit vitam per emanationem principium in trinsecum connotans, ita informaturanima, vt per vnionem substantialem dicat actum primum vegetationis, & censationis: vitalitas vero nil aliud est, quam communicatio animæ per nativumcalorem, vt movet imaginatio in animi passiones retrahens spiritus in merore, effundensque eos cum sanguine inamore, aut gaudio, effervecensque in ira circa cordis vilcera biliosum sanguinem, vnde hi motus fanguinis, & spirituum hinc inde vergentes, aut indeterminate vagantes ab ipsamet anima proveniut medio calore nativo, quo vtitur, vt principali instrumento suarum operationum: vnde cum detur motus in sanguine, & spiritibus, in bile, & alijs humoribus, & vivens constituatur in actu primo per principium intrinsecum motus, & sensus à se, nam quid quid movetur ab extrinseco, ab alio movetur, non vero quidquid moveturà se.

Advertendum est 3. quod sanguis instrumentu

est principalissimum animæ, ita vt si ipse desicerer, desiceret animæ, informatio, & ratio est, quia sanguis, est materia necessaria spirituum, & nutrizionis; de inde desiceret calor naturalis quia desiceret pabulum ipsius: sed non ex inde sequitur; quod sanguis habeat vitam, neque sit nostri corporis pars, & ratio est quia sanguis est alimentum partium, & se habet, vt elementum componens mixtum: & sicut in auro, vg. composito ex elementis; calor non est aurum, neque frigus, neque sorma auri: ita neque sanguis in vivente erit vivens, sed elementum; aut alimentum partium viventium.

Præter quam quod sanguis, vt dicatur pars corporis necesseest, vt propriam amittat formam substantialem, quia ex venis ipsum atrahunt partes ad modum roris per venarum, & arteriarum poros, ex rore transit ingluten, & magis partiassimilatur: vnde per aliam alterationem transit in cambium, & per veram putritionem in substantiam aliti convertitur, & tunc neque remote sanguis dicitur, sed pars iam anima informata; quæis positis.

mon aliquis merentur nomen partis corporis humani.
Primo probo meam conclusionem ex Galeno 2. de elementis cap. 6, & 1. de natura humana voi sic aloquitur: sanguinem, & alios tres succos, pituitam, dico, & vtranque bilem esse elementa secunda, idest damenta propria, & peculiaria animalium sanguine

23.

præditorum, quod scilicetilla materia sit generationi eorum idonea , itaque esse eorum elementa, non partes, non enim qua sant in aliquo, vt elementa, vt partes sunt, neque eadem sunt forma cum rebus, quarum sunt element a: ergo expresse ex Galeni sententia, sanguis, spiritus, & humores ceteri non sortiuntur nomen partis corporis humani:constat etiam ex Hipp. e lib. de alimento: exornatque hanc sententia Stagirita Phylosophus 2. in historia de partibus animalium cap. 3. vbi inquit: sanguis alimenti solum gratia datus est animantibus, neque partem eorum esse ex cansa qua abundat, & deficit, & ex modo quo intra corpora est, disiunctus scilicet, & minime continuatus, vt opportebat, si pars illorum esset: ergo sanguis, spiritus, & cæteri humores nullo modo sunt par tes corporis humani.

corporis informaretur anima; sed sanguis esset pars corporis informaretur anima; sed sanguis non informatur anima: erg. sanguis non est pars corporis; maior est certa: minor probatur; nam si sanguis informaretur anima, esset continuus per vnionem substantialem formæ cum corpore substantiale; sed saguis non vnitur per vnionem substantialem formæ cum corpore substantiali: ergo sanguis non informatur anima; probatur minor quia si sanguis esset vnitus corpori per vnionem substantialem formæ nutritio repugnaret ab intrinseco: sed hoc non est dicendum; ergo sanguis non est continuus corpori

per vnionem substantialem formæ, patet assumptum: nan ideo sanguis transit in rorem, cambium, & gluten, vt parti nutriendæ assimiletur, sed hoc haberet sanguis antecedenter, si esset pars corporis, & vniretur vnione formali corpori: ergo repugnaret nutritio ab intrinseco: nam ad quid tot mutationes, & alterationes sanguinis, vt convertatur in substantiam aliti, & nutriti?

Argues t. Sanguis, & spiritus hinc inde velociter movetur intra corporis viscera, sed hoc provenit ab aliqua forma viventis: ergo sanguis, & spiritus informatur anima: sed ex eo quod informentur anima sunt partes corporis: ergo sanguis, & spiritus sunt partes corporis. Comprobatur assertum, quia statim quo guadium persentimus, spiritus, & sanguis quasi essunduntur, & moventur ad extra; in mærore igitur retrahuntur, & in sensu, & motu voluntario facultas operatur medio motu spirituum.

Respondeo distinguendo maiorem: sanguis, & spiritus hinc, inde moventur abaliquo principio intrinseco movente eos: nego maiorem: ab aliquo principio extrinseco alterius viventis, concedo maiorem, vel iterum distinguo: sanguis, & spiritus hinc inde moventur, per propriam emanationem, nego: per emanationem formæ substantialis corporis viventis, concedo. Vnde moventur sanguis, & spiritus, sicuti, & reliqui humores, per vitalitatem, non vero per vitam, quia vita nil aliud est, quam principium

intrinsecum, sensus, & motus; vitalis vero est communicatio vitæ medio calore nativo.

Argues 2. In morte hominis sanguis coagultatur, & frigefit, sed non coagultaretur, nec frigefieret si adesset vita: ergo quia informabatur anima; patet assumptum in sanguinis missione, in qua sanguis concrescit; sed non obaliam ratione, nisi quia est extra corpus: ergo é contra: si in corpore cum vita diu perduraret calidus, & ad motum proclivis anima informatur.

Cai argumento respondetur: in morte hominis sanguis frigefit, & coagulatur quia deficit ipsi vita, nego: quia deficit illi calor naturalis, cocedo, præter quam quod sanguis coagulatur præcipue ratione fibrarum, vt communis est medicorum opinio. Ad id de sanguinis missione facile respondetur: nam ibi calidus apparet, saltim pro aliquo temporis spatio, & tamen non vivit, quod si ita esset pars quælibet corporis, quæ erat vnita, & informata anima, auferrereturabique eo quod persentiretur in corpore neque noxium maximum inducerer, quia corpus effet diminutum, & defectibile, eo quod auferrereturpars continua illis, & daretur morbus in numero, citu, figura, & magnitudine: fed hoc non est dicendum: ergo The second of th

peficient species of the period of the rights of the formation of the field of the first

The state and a contract of the state of

SECTIOV.

Vtrum operationes immediate proveniant d partibus simplicibus, & mediate ab instrumențalibus?

Oto 1. quod partes simplices nullam aliam dicunt compositionem, præter formam substantialem, & qualitates elementorum, à quibus immediate procedunt, & ideo quiliber affectus in ipsisper alterationem curatur, eo quod semper in aliqua intemperie consistat, vt constat ex Galeno millies in locis, & primo meth. lib. per totum; 7: meth. cap. 2, & 3. lib. de inæquali intemperie: & cum hoc sit receptissimum apud medicinæ Proceres, vt verum suppono, & ratio est: quia morbus vt sic dividitur in intemperiem, quæ convenit partibus simplicibus, ma lam compositionem, quæ partibus instrumetalibus, & solutionem continui, quæ vtriusque communis est assertio.

Noto 2. quod operationes, vt fiant, necessario dicunt sacultatem tamquam causam essicientem, & instrumentum, quo vtitur ad eas eliciendas, & præter hoc aptitudinem proprij instrumenti, vnde hæc aptitudo, quam dicit omne instrumentum, àpartibus simplicibus suscipitur, quia ab eo accipit instrumentum aptitudinem, à quo accipit esse compositionis, & instrumenti, & cum accipiat instrumentum esse esse à partibus simplicibus, inde est quod accipiat abeis

abeis aptitudinem, & consequenten immediatius procedunt operationes à partibus simplicibus: 30

Dicor Operationes immediatius procedunt à partibus simplicibus, & secundario à partibus instrumentalibus. Probatur 1. ex Gal. lib. 1. Meth. c 6. vbi ait: est enim instrumentum oculus, actio vero vissio una exparticulis eius similaris, ac primum visfroms instrumentum: scilicet, humor chrystalinus; ergoexpresse ex Galipars simplex oculi, humor chrystali nus, & non totus oculus vistionem efficit : fed vistio elt operatio: ergo operatio immediatius procedità partibus simplicibus. Les of contractions of a cop

Probatur 2. ratione cum Sapientissimo Doctore Vallessio, quia partes simplices sunt, qua dant esse partibus instrumentalibus; ergo dant illis hunc modum operandi; patet, quia partes simplices prius sunt inesse, quam partes composite : sed eo quod sint prius in esse, ratione operationum, primario ope rationes ipsis debent tribuis ergo secundario instrumentalibus: assumptum patet, quia quæliber tela oculum componens, & quilibet homor tromen partis sortitur simplicis, sed non instrumenti, evsque dum coniunctim totum oculum componanti ergo prius sunt partes simplices ceorsim, & secundario instrumentum efficiunt, cum in actuali exercitio totum oculum componant.

Argues 1: ex Galeno; qui libelloale differentis morboium capite 3. partes simplices instrumon-

cum

tum appellat; ergo immediate procedunt operationes à partibus instrumentalibus, cum partes simplices appellet Gal. instrumenta, vt constat ex his verbis; simplices sunt arteria, vena, & nerbi, cartilago, ligamentum. Aristoteles 2. de partibus animalium cap. 2. inquit: Sicca & solida inter homogeneas partes sunt os, spina, nerbus, vena, itaque arteria sunt simplices.

Cui dubitationi, Respondeo distinguendo probationem cui pso Doct. Sapientissimo Vallesio lib. 2. controv. venæ, & arteriæ sunt partes simplices, quo ad sensum, concedo; in essendo, nego; quia vena, & arteria ex triplici genere substantiæ componitur, scilicet, membranosa, sibrosa, & cartilaginosa.

Argues. 2. Atractio manus, vel proiectio lapidis provenit ab ipla manu immediate, sed tota manus est pars instrumentalis: ergo atractio manus, vel lapidis depulsio provenit ab ipsa manu, tamquam ab instrumento immediato. Respondeo distinguendo maiorem; atractio manus, vel lapidis proiectio provenit ab ipsa manu immediate, quo ad vium concedo maiorem, immediate quo ad compositionem præcisse nego maiorem: hoc est sigura manus requiritur quo ad vium atractionis, sed tamen, si pars aliqua simplex manus distemperetur, neque impulsio siet, neque atractio, quod corrobotatur Galeni exemplo in crure intemperato a nimie frigore amitente motum naturalem.

V trumin morte hominis sint vere partes?

Oto quod partis nomen essentialiter accipitur in ordine, & relatione adtotum substantiale copletum, anima præcisse informatum. Vnde cum in morte hominis sit aliud totum forma cadaverica informatum, inde est, vt solum denominative, & non entitative nomen partis mercantur cor, hepar, &c. admodum quo dicitur apud vulgum Petrum, l. Paulum sepelliri, cum tantum sepelliatur corpus,

quod Perrierat.

Dico 1. In morte hominis non sunt partes vere, entitative. Probatur 1. quia voi repugnat desinitio, repugnat eius desinitum; sed in morte hominis repugnat desinitio partium; ergo & partes: minor patet ex propria partis desinitione, & entitativa, scilicet corpus toti cohærens, communi etiam vita coniunctum ad illius actionem, & vsum comparatum sed hæc desinitio in morte hominis repugnat: ergo, & eius desinitum, &c. Item duplex sequæretur contradictorium, quia in morte hominis daretur actio partis, & non daretur; ergo: patet sequæla, quia daretur actio, vt constat ex propria partis desinitione, & non daretur, quia datur privatio, & abolitio actionis; ergo &c.

Argues 1. In morte hominis fit Anathomia, sed anathomia est recta partium corporis humani di-

G2

256

vissio; ergo in morte hominis dantur veræ, & rectæ partes. Respondes distinguendo minorem, sed anathomia est recta partiumdenominative divissio cor poris humani, concedo, entitativa, nego, nam entitative corpus cadavericum appellatur: denominative autem, corpus Petri, aut Pauli. Et sie respon-

nere potestis cæteris argumentis.

Sed quæres, quæ pars primo generetur in vtero? & respondeo cum Sapientissimo Antonio Laurentio in sua Anathomia, quod partes in esse primo sur membranæ sætum involbentes; deinde respectu partium principalium, jecur primo generatur, deinde cor, postea cerebrum; hunc ordinem experientia commostravit Hyppocalib, de natura humana, vbi inquit; genitura postquam permista, & retenta fuent quacumque die, & hora excernatur pellicular quadam quasi crustra perpetuo tecta excernitur, huius sententiæ est Aristoteles, & Gal.

ctientain, cocimulant daliment, opera, "estim compensum let hec delle per in norse hardins repugh est go. Chine uchina engle el lettado ilea fequal est cocia decontra como recur; er por pares sis dareteradito per este este este est propria fequala, cuia daretur acelo, er cordas es propria partis definicione, & non daretur, quia datur preva-

TRAS CurTinAuq TichUS

SECTIOI

De natura, & divisioné signorum.

IGNVM, quoda significando dicitur, est illud quod præterid, quod sensuirepræsentat, facit nos in alterius rei nobis ignotæcognitionem venire. V t vi ina naturalis, & cocta, quæ præter colorem, substantiam, & conten-

tum, quæ vissu percipiuntur, denotat etiam naturam intra vassa supperare humorem morbum sa-

cientem, & fic de alijs signis.

Dividuntur vero figna in demonstrativa, & prognostica; demonstrativa sunt, qua prasentem morbum ostendunt, & adhuc ita sunt pathognomonica: id est passionis significantia: dicuntur que talia, quia simul invadunt cum morbo, & sunt propria, & inseparabilia à morbo: vt calor adurens, & stris incompescibilis significant sebrem ardentem: suniliter de lirium perpetuum, & febris accuta continua

cunit in his tribus, fed enam in operation bas na-

of a side as a state of the same

periuntur illa quinque signa, à Galeno, & omnibus Medicis sæpius tradita: nimirum sebris accuta, pul sus durus, dolor punctorius, tussis, & respirationis dissicultas: atque adeo sunt ista signa suarum passionum demonstrativa, vt bene valeat argumentum à positione signorum, ad positionem morbi, & écot. valet enim adest ingens calor, & sitis incompescibilis: ergo & febris ardens, & negative similiter in alijs morbis possumus argumentari.

Alia vero demonstrativa sunt, quæ vocantur ac cidentia, ea scilicet, quæ non necessario invadunt cum morbo, sed aliquando, neque sunt propria, & inceparabilia à morbo, vi in sebre ardente vomitus,

aut deiectio biliosa, & capitis dolor.

Alia signa, scilicet prognostica, sunt, quæ suturti eventum prænuntiant: & hæc sunt in triplici disserentia: quædam sunt signa coctionis, & cruditatis: alia sunt signa salutis, aut mortis: alia demum decretoria: omnia vero hæc signa conveniunt in hoc, quod non postulant ex sua natura invadere simul cum morbo, sed paulo post, & dicuntur mox apparientia, aut supervenientia: justa Hyppocratem 1. aphor. tex. 12.

aphor. tex. 12.

Signa coctionis, & cruditatis reperiuntur in his tribus, vt Gal. docet in vrinis, in excrementis ventris inferioris, & in sputis: signa salutis, aut mortis, non solum in his tribus, sed etiam in operationibus na-

turalibus, vitalibus, & animalibus, & etiam in toto

corpore reperiuntur.

Ofendunt: & licet hæc non possint apparere in principio, aliquando tamen suo tempore eveniunt, & in

augmento, & summovigore.

Rursus huiusmodi signa sunt in duplici dissertia: quedam enim præter hoc quod signorum rationem habent, suns etiam causæ, vt vomitus, deiectio, sluxus sanguinis enaribus, & alia huiusmodi: hæc enim præter hoc, quod significant corporis dispositionem, possunt in corpore aliquid vlterius caufare, cum per has evacuationes evacuetur pars humoris sacientis morbum; alia sunt, quæ tantum habent rationem signorum, vt dolor capitis, tenebri-

cosa vertigo, &c.

Inter hæc signa prognostica advertenda est disferentia, quam insinuat Gal. 1. de causis cap. 15. qui
ait: signa coctionis, & cruditatis certa esse, & sida,
habent enim stabilem significationem, eo quod ex
sua natura vnum tantum significant, vt si appareat
vrina cum optimo colore, & sedimento alvo, levi,
& æquali: absolute dicimus, vrinam esse bonam:
sivero semper sit aquosa, & sine subsidentia: absolute
dicimus esse malam: cæterum signa decretoria no
ita sensent, sed eorum natura incerta est, & insida: nam pro diversitate temporum morbi, inquibus apparent diversa significant: quod optime ex-

plicuit Hypp. 2. epidemion, parte 1ª. cap. 9. voi asserit: decretoria, qua non desernant, aut lathalia, aut discilia. Quasi dicat: signa decretoria quando non contingunt, vt auseratur morbus, aut notabiliter minuatur lathalia, id est ex ipsis sequi solet mors, aut dissicile iudicium: appellantur autem talia, quando contingunt plures absesus, aut plures evacuationes, vt si in agrocante contingat mentis perturbatio, anxietas, vertigo &c. hac signa decretoria sunt, non tamen habent stabilem significationem, ad bonum, aut ad malum: nam si appareaut in principio sunt maligna: cum requisitis vero ad crisim sunt bona, & pro inde appellantur enimà Galeno lib artismedica cap. 84. neutra, aliquando vnum, aliquando vero alterum significant.

Poterit quis dubitare: an maior vis repiriatur in malo signo ad præsagiendam mortem, quam in bono ad prædicenda salutem. Respondetur: quod si sermo sit de signis salutis, aut mortis, maiorem vin habet malum signum ad mortem signissicanda, quam bonum ad prædicendam salutem, quod ideo contingit: quoniam ad vitam necessariæ sunt pluriu sacultatum actiones, ad mortem vero sussacit vna extreme debilis: v.g. melius colligitur ex pessimo decubitu ægrum interiturum, quam ex optimo decubitu sanum evasurum. Si vero sermo sit de signis coctionis dicendum est e contra: hæc enim signa esticatiora sunt ad præsagiendam salutem, cum oste-

oftendunt victoriam naturæ supra causam morbi: figna vero cruditatis inefficationa funt; quia contingit sæpe, in summa ciuditate, quando iam est desperata salus, causam morbi evacuari ad partem ignobilem, aut extra corpus, & ita Gal. 39, de crisibus cap. 4. ait: signa optimæ crisis, subquibus etiam Cona coctionis, & cruditatis, babent plurimum scien tia, & certitudinis, signa vero cruditatis mala certitudis habere potius plurimum coniectura. Quod optime explicuit Avic. fen. 2.4. tex. 2. cap. 3. sed id quod diximus de certitudine signorum coctionis ad præsagiendam salutem de vet intelligi de signis coctionis, subsequente postea aliqua evacuatione : quod colligitur ex Hypp, 1. prorrecticorum com. 24. vbi inquit: vrinæ coctæ malæ,nisi adsit aliqua evacuatio: tum propterea opportet attendere ad præsagiendum ex signis coctionis, ansit vnicus tantum morbus? an cum eo sint plures complicati? & hæc est causa propter quam Hypp, 13, morb part 3. agrotum, inquit, Anaxionem laborantem pleuritide, non solum ab eva cuatione, per sputum, sed etia sudore liberatum fuisse, eo quod non solum laborabat pleuritide, sed etiam febre pudrida, Et propter eandem causan reffer Hypp: 1. de morbis vulgar. par. 2. cap. 84. Pictoris ancillam cocto, & Suppurato tum ore post aures interifse: cuius eventus causa miratur Gal incommento, cum dictum fuerit ab eodem Hypp. coctionis juditium celeritatem, & securitatem fignificas

ficare. Ratio vero eventus ea est: quia cum non solum illa laborasset tumore, sed etiam putrida sebre: continua, cocta suit materia tumoris: non vero humor putridus, qui erat causa febris continuæ, cuius ratione illi mors supervenit.

Quid nomine criss intelligatur? & quid sit?

C Risis, vt docet Gal. 3. prog. tex. 1. de sumpta est ad significandum in soro exteriori: denotat que subitum iuditium, quod constat; reo, testibus, accusatore, judice, & patrono, ac desensore: ita pariter juditium, quod intra corpus nostrum repentur constat ex his omnibus, secundum proportionem; æger est, qui assimilatur reo, sympthomata quæ ostendunt qualiter se habeat morbus, subeunt vicem testium, ex ipsis enim iudicatur, anæger sit moriturus, necne: accusatoris vim gerit morbus, patronus est ipsa natura, quæ contendit causam ægrotantis desendere, judicis rationem habet medicus, ipse enim iuxta naturam signorum profert sententiam de salute, aut morte.

Notandum etiam est: hoc nomen crisis sive judicium varia significare, apud Hypp. & Gal; nam aliquando solutionem morbi: ita ille depræceptis, vbi dixit: iudicatio est morbi solutio. Aliquando vezo significat evacuationem, quæsti in crisi, iuxta il-

30.

lud Hypp. 2. 2 phor. 13. Quibus cumque crisis, id est, indicatio sit, his nox gravis ante accessionem, que vero subsequitur magna exparte levior existit. sumitur autem ibi crisis, non pro perturbatione, que adest ante evacuationem, sed pro ipsamet evacuatione. Ratio vero propterquam tempus ante crisim est dissicile, ea est quia eo tempore mali succi abonis separantur, vnde exilla motione magis irritant, & molestant tales succi, & sumosa que dam excrementa ad plures partes occurrunt. Aliquando etiam crisis dicitur a perturbatione præcedenti, vt docet Gal.

10 de diebus decretorijs cap. 1.

Vlterius notandum est; quatuor modis dici crisim, aut enim pro subita mutatione in salutem, aut pro subita mutatione in mortem, aut in melius, aut deterius, ve refert Gal. 1. de crisibus cap. 1. & 3. prog com. 1. & ex Hypp. 10. epid, part. 3. tex. 26. licet proprie, & simpliciter dicatur de subita mutatione ad salutem; quiaquando subita mutatio contingit in melius, aut in deterius, dicitur imperfecta crisis, nec obstat, quod 3º. de crisibus, sex modis circa morbos contingere mutationem statuit Gal. itaque simpliciter, & absolute crisis sumitur, pro subita mutatione ad salutem, vt docet Gal. 10. de diebus decretorijs cap. 2, & 3. de crisibus cap. 7. quæ crisis simpliciter dicta devet habere has conditiones. Primo devet esse perfecta, id est per quam nihil relinquatur materiæ morbificæ. 2 devet esse fida, idest si-

H2

ne signis tesidive: 30. devet esse manifesta, idest cum fensibili evacuatione, vel absessu. 40. devet esse tuta, idest sine gravissimis sympthomatibus. 50. ve per ea morbus terminetur ad salutem, quod si has omnes conditiones non habeat, non devet dici bona crisis.

Inter has conditiones illa indiget animadvertios ne, in qua dicitur: devere sieri crisim cum aliqua sensibili evacuatione, aut absessu: nam 2. prog tex. 29. inquit Gal; sape maximam in morbis vilitatem sentiri, quando quis longo temporis spatio vigil permansit, & postea profundo somno fuit correptus, solet enim aufferri morbus, maxime in pueris, qui modi per insensibilem funt evacuationem, qua præcertim solent liberari pueri, vt pote calidi; & humudi. Et clarius 3. prog. cap. 1. docer; celerem mutationem, in morbis puerorum, contingere inter dormiendum, quare crisis simpliciter perfecta devet sieri cum aliqua sensibili evacuatione, aut absessu; nam alia mutatio quæ per insensibilem transpirationem sit, licet 12pius afferat vtilitatem maximam, tamen in rigore non meretur nomen crisis, nam mutatio in vapore mon fit subitaysed paulatim...m. sage according

Advertendum est tribus modis posse hominem liberaria morbis: & quatuor modis contingere quod ægrotus pereat: potest enim homo sanitati restitui per crifim dictam simpliciter, & vlterius per crifim imperfectam, & præterea paulatim, progreditate morbo sine crisi, quando paulatim procedir mor-STATE OF

bus, & motu tardo, finitur fine crifi: fimiliter his tribus modis potest interire, aut subiro deducto homi. ne ad mortem: secundo per crisim impersectam, & præterea sine crist, quando paularim ad mortem progreditur, quem admodum Gal. appellat 3. de crisibus cap. 1. marcorem, sive senectutem, Morbi tamen alij, quarto modo hominem interimunt subito, & sine crisi: vt.quando in principio vniversali ali, cuius morbi, ex multitudine, aut crasitie humorum sufocationem patitur, cui modo mòrtis non correspond et alter, per quem possit sanitatiresticui; non enim potesthomo, asque crisi subito sanitati restitui; potelt tamen subito finealla interire. Il moup autoto

Deinde supponere opportet duplicem crisim, ex Gal. doctrina 3. de crisibus, cap. 3.nam quædam est bona: quædam vero mala: bona autem quibusdam conditionibus constare devet: scilicet, vt fiat præcedentibus signis coctionis, quæ dum quis laborat putrida febre conciderantur in vrina dum morbisunt in ventre inferiori conciderantur indeiectionibus; si autem morbi fuerint in thorace concideras tur in spuris, Secundo crisis devet esse in dicara aliquo signo, & indie indice, & cum aliqua evacuatione, 1. absessu, in quo devet servari rectitudo.

Mala crisis aliqua habet in quibus differt abona præsertim, quod non hat cum signis coctionis, aut secundam rectitutudinem, nec cum evacuatione, autablessu, convenit auten cum bona, quia solet

-110

let esse indicata, & indie iudicatio; tamen signum, quod indicat crisim, etiam ostendit suturam esse malam nam si exalijs signis constat morbum esse iudicandum per crisim; sinubecula appareat quarto die alba, levis, & aqualis existimare opportet morbum iudicandum esse in salutem septimo die : si quarto eodem appareat nubecula nigra, iudicabitur morbusin mortem septimo. Sic docet Hypp. 1. epid. parte 3. contigisse Philino, & Philisto.

Perperam ergo vulgus existimat, quod quando indiebus iudicatorijs deterius se habet æger melius est: ita vt ex hac causa maior certirudo salutis desumatur, quam si bene se habeat: oppositum absque dubio verum est, quod colligitur ex Hypp. 1. epid. part. 2. comm. 25. vbi narrat pellima figna, que in illa rempestate contingebant in diebus iudicatorijs, dum explicatillam sententiam. Galenus autem non folum illo loco, sed 3. de diebus decretorijs dixit: malam mutationem in diebus iudicatorijs esse signum læthalis morbi; bonam vero elle fignum morbi tendentis in salutem: ita vt signa, quæ contingut. in die ludicatorio, habeat maiorem vim in judicando: quod colligitur ex Hypp. 2. prog. 54. vbi dum explicat speciem quadam pessimi sputi, absolute dicir esse malam: pessimam si die septima incipiat: cuius diei nomine intelligit omnem die decretorium, & 3. prog. cap. 9. pessimum esse tumorem rubium in collo apparentem statim evanescere, & addit præ

certim in diebus decretorijs, si evanescat: in cuius confirmationem venit illud, quod Hypp, 1. prorret. 4. ait Stilla sanguinis pernares, mala, pracertim fe in quarto die inceperint; est enim hoc signum in morbis accutis pessimum, nam significat humoremrapi ad caput, nec posse detineri, aut propter malam qualitatemirritantem, aut propter debilem facultatem, tamendeterius erit hoc signum si appareat in quarto, cuius nomine, etiam quilibet intelligitur decretorius: tamen vt docet Galenus 3. de crisibus cap, 4. signa, quæostendunt bonam crisim suturam, maiorem habent certifudinem, aut plus scientiæ: quæ vero cotingunt in crisi mala, plus incertitudinis, & coniecturæ. Ratio est; quia motus regularis naturæest ordinatus: itaque nam dum recte operatur, semper cu ordine operatur, quando vero malé, sine illo: & quia varij, & diversi motus naturæ, sine ordine sunt, ideo tales minimum habent scientiæ, & plus in certitudi-

nis, & coniectura. A odicar potissimum sumuntur signa ad cognoscendum, vtrum aliquis morbus deveat per erisim terminari, vel écontra; nam ex specie, & idea morbi cognoscitur primo vt si febris sit ardens, vel accuta pleuritis, & ex motu, & magnitudine, reliqua enim qua sumuntur à causis externis, vt regione, tempore, &c. juvant ad cognitionemeius, quod dictum est, vnde species morbi cognoscitur ex pathognomonicis signis; motus vero, ex ve-

locitate, aut tarditate ipfius: nam morbus, ve finiatur per crisim devet habere celerem morum ; idest brevi tempore devet pervenire, ad statum, quod cognoscitur ex eo quod accidentia, brevi tempore contingunt similiter vt Galenus docet in methodo, tribus modis dicitur morbus magnus; ex essentia, exprincipatu partis, & ex cachochymia: magnitus do marbi ex propria essentia cognoscitur, ex magnitudine sympthomatum, que dicuntur pathognomonica: tafia enim indicant morbi estentiam; quod autent morbus sit mali moris cognoscitur ex supervenientibus accidentibus; quod vero sit magnus ratione partis cognosciour ex lassione alicuius partis phincipis, & ex migna diffimilitudine actionis illius partis ad naturales. Perperam actem Angentalibide diff, morb repræhendit Gl.quod non traddideridaliquam differentiam morbi magni in communi, cum facile ex doctrina Galeni deducatur, & præcipue 7. methodi cap. vlt. nam morbo magno in communi menoills is commented in the second in the s

Ex quo recte explicari potest dubitatio quædam existimantium, quod sebris diaria est in parte principe scilicet in corde, & tamen non est morbus magnus. Respondetur quod sebris diaria licet sit in parte principe, scilicet corde, non tamen insert magnam læssionem in actionibus partis principis; similiter in jecore potest esse aliquis tumor tam exi-

guus

guus, aut aliqua intemperies, ex quibus tan parum vitietur coctio, vt neque in hac fignificatione, dicatur morbus magnus: quocunque autem ex his modis magnitudo contingat fignum est terminationis

per crifim.

Nec solum potest medicus cognoscere id quod dictum est, sed ex opposito cognoscit non esse terminandum morbum per crisim; potissimum autem deducitur hoc, vt recte Galenus docet, ex debilitate virtutis, quia virtus debilis non insurgit contra na turam morbi, nec pugnat cum ca, hoc est cum causa, sed etiam maximi momenti est concideratiodiei, in quo futura sit crisis, quod sit conciderando diem, in quo incipit coctio manifesta, vt si morbus habeat manifestam coctionem in quarta die, indicabitut in septima.

Tamen circa dies, in quibus accidunt crises, opus est advertere, quod Galenus in quit; adeo raro contingere, crisim quarta die supervenire vt Archig toto suo tempore, bis tantum illam vidisset: Galen. vero semel: reffert autem Hypp. crisim in quarto die factam 3. epidemion parte 3. ægroto 6. Rationem vero huius tan rari eventus adducit Vall. in explicatione huius loci Hypp dicit enim, quod aut morbus est, qui movetur per pares, aut impares dies, aut est de genere febrium continentium! ista licet adeo accutæ lint, vt crisim, aut iudiciu possint quarto die habere: tamen raro febres tales contingunt, &

raro etiam non reperitur humor in earum curatione: si vero sebres sint habentes accessiones per dies pares, licet quantum ad influxum superioris cause, in quarto die deveret sieri crisis: tamen, quia tales morbi pendent ex contumacia, & dissicili materiæ motu, non sunt odeo accutæ, vt possint terminari intra quatuor dies: non obediente autem materia, ad aliquem essectum parum ressert virtus causæ essicientis, vt talis essectus sequatur: si autem morbi causa mutationes habeat per impares, non potest esse se crisis in quarto, quin potius, vel anticipat crisim, & sit in terrio, vel postponitad quintum.

Sed hic communis intellectus loci Galeni, non videtur secundum authoris mentem: quia cum ex eodem Galeno supra citato; febres continentes ex propria natura iudicantur in quarto:non est credibile, cum tempore Galeni, toties conregissent, & satis verisimile eum tales febres herrore non curaffe, tamen nec crisim vidisset in quarto die, nisi semel:ponus vero existimare opporter loquitum fuisse G1. in omnibus morbis, qui habet exsacerbationem tertio quoque die, & per dies impares, tales raro poffunt habere crisim in quarto: quia talis dies est dies remissionis: vep urimum vero contingit crisis in die exfacerbationis: hanc dubitationem licet colligere, ex Avie loco citato vorinquit: & rarofit crisis in die tranquilitatis, & quietis: ita vt Archig, tantumbis, Galenus vero semel, itaque, quod Gal. explicat

nomine quarti diei, Avic. intelligit per diem tranquilitatis, & quietis, scilicet diem remissionis febris: nam absque dubio frequentissime contingit fieri crisim in die exfacerbationis, ad quod comprobandum Gal 3. de crifibus, cap 10. adducit illam sententia Hyyp. 2. aphorismorum 13. Quibuscamque crisis futura est, his non gravis ante accessionem. Idem autem est dicere nox ante accessionem, quod ante evacuationem criticam: quiatalis inaccessione contingir, & propterea dicit Hypp. 1. epidemion parte 3. c. 8. qua paribus diebus moventur, paribus indicantur. Habet enim crisis hoc commune cum die exsacerba tionis, nam vtrobique irritata natura pellit humorem: opporter autem advertere, quod quando morbiaccuti contingunt; qui moventur per dies pares, multo periculofiores existimandi sunt, & magis la thales, quam qui moventur, per dies impares. Ratio est: quia cum inter dies indicatorios, quidam fint potentiores, & magis efficaces, quales sunt impares, & maiori efficatia eorum, maius robur in facultate ægrotantis coparatur: vnde quia id efficit in morbis, qui moventur per pares: ideo tales morbi magis tis mendi sunt, vt pote cum maiori periculo, quoniam facultatem habent minorem relistentiam præstanin the factor and the comment of the

ราม 5 เมษาร์ สามาร์ส โดรสาร์สุราธิภาษา สสามาร์สุดราชสามาร

Quod tempore tutius appareant crises?

In hac dubitatione reliqua devent esse parià, sola diversitate ex parte temporis desumpta: experietia enim demonstrat: aliquando sieri crisim interdiu, aliquando noctu; potestque proposita dubitatio duobus modis intelligi, scilicet, quo tempore copiosiores contingant crisicæ evacuationes, aut quo

tempore fiant tutius and a supplemental and to be for

Dico go. primo; absolute, & simplicer copiosiores fieri criticas evacuationes noctu, quam diu, s probatur: quia fifer no sit de illis, que fiunt motis humoribus, ab externis partibus, ad internas, res est apperta: tum quia iuvat motionem humorum ad internas partes constrictio, que noctu fit, & præterea iuvat evacuationem maius robur facultatum, quod eo tempore eis comparatur, ex eo quod spiritus moventurad eas partes: & licet aliquæ evacuationes fiant operante animali facultate sentienti, in his etia est maius robur propter dictam rationem: si vero evacuatio contingat motis humoribus ab internis, ad externas partes, etiam sunt copiosiores noctu: quia multo magis conducit ad eas robur facultatum in partibus internis, quam contrarius motus humorum, qui noctu fit, vt pote ab externis ad inter-nas partes, quod experientia constattin sudore enim multo copiosior contingit inter dormiendum, quam

inter vigillandum, etiam si tempore somni humores moyeantur ab externis ad internas partes.

Dico 2. quod si nomine crisis intelligamus labores, & anxietates, quæ contingunt ante evacuationem multo tutiores contingunt diu, quam noctu, vt pote : quia labor contingit tempore consuetæ quietis; si vero tan evacuatio, quam labor contingere devent diu, ac noctu, conciderare opportet an æger periclitetur propter virtutis debilitatem? an vero propter materiæ multitudinem? si primum tutius contingit, propterea, quod noctu magis debilitetur virtus exprædictis causis; si vero secundum; tutius contingit coctu, eo quod copiosius eo tempore materia vacuetur, vt explicatum est.

Sed duo sunt, quæ indigent animadversione:alterum est, quod dicitur communiter:evacuationem per insensibilem transpirationem multum vberius contingere interdormiendum, quam intervigillandum, ex eo quod Galenus 3. prog. cap. 4. asserit: aliquando pueros celeriter liberari à morbis logo somno, ita vt quidam crifim hanc evacuationem appe-

V F in the state of Oppositum autem verum est, atque adeo existimare opportet, potius inter vigillandum hanc evacuationem fieri copiosiorem; quod colligitur exGal 12. meth. cap. 3: vbi docet; laborantes syncope exmultitudine pravorum succorum prohivendos esse à somno multo, eo quod non solum gravat viscera, fed

fed prohibet digestionem, atque multo melius agitatur: sivicism somnum, & vigisliam consulamus, ita ve per somnum concoquantur humores, per vigillias digerantur; & 6. epidemion parte 4. cap. 14. docet Hypp. in vigislia externas partes esse calidiores, internas vero magis frigidas; contra vero in som no. Ex quo colligitur potius motum versus cutim contingere in vigislia, quam in somno, & consequeter, potius in evacuatione, quæ sit per cutim.

VIterius vero disputandum erit, quod dicebamus de sudore: nam videtur non esse copiosiorem in somno, quam in vigillia, siquiden humores inter dormiendum retrocedunt ab externis ad internas fed re vera primum est verum, quod non folum, docet experientia: sed Avic. 2. primi Doct. 2. cap. 13. vbi docet; omnes evacuationes cohiberi somno, præter sudores. Ratio autem est: quia omnes indigent operatione animalis facultatis, quæ intercipitur somno: sed causa propter quam sudor abundantior fit in somno est, quia inter vigilliam dum vapor, qui ad cutim ascendit apropinquat illi calida, & rara; vnde spirat vapor in propriam speciem, at vero inter dormiendum cutis elt frigidior, & densior, & exconsequenti, magis sibi detinet vapores, & in aquea. naturam mutantur : quod contingit compræssione facta ab exigua frigiditate; vt videmus vaporem ex aqua elevarum ab igne concrescere in operculo, etiam si intensum calorem habeat, Accedit viterius, 1

quia se pe contingit in venis; & arterijs, quæ sunt prope cutim plurimam seri quantitatem detineri; inter dormienum vero; cum illæ partes destituantur, calore insluenti, evacuatur per poros ipsa serositas indictis vassis contanta, vel congestione earundem partium sacta à frigiditate, vel propter debilitatem facultatis retinentis.

SECTIO IIII. In evacuationes sympthomaticae possint aliquando vtiles esse?

Vanquam enim plurimis modis evacuationes dicantur sympthomaticæ, tamen in præsenti dubitatione dicuntur tales rempore, hoc est quando sint ante signa coctionis materiæ morbisicæ: viden tur autem tales evacuationes semper esse malas, na dictum est à Galeno 4. aphorismorum tex. 2. quando aliquis incipit morbus nihil tunc exernitur ratione natural sed omnino sunt cassus earum, qua sintin corpore; quo tempore aliquid bene vacuari est impossibile.

Secundo probatur, non solum, ve signa tales evacuationes esse malass sed etiam, ve causas; ve signa enim; quia ostendunt ante devitum te inpus irritari naturam ad expulsionem; proprer pravam qualitar tem. & quantitatem humoris: vnde Galenus i de crisibus cap. 8. ait; aut mortem, aut morbi longitu dinem, aut residivas significare. Malas etiam esse tales evacuationes, vt causas probatur ex Hyppoc. 10. epidemion part. 3. tex. 26. vbi reffert: sudores non solumiuvare, sed la dere, & reddit causam Galen. in commento: quia erat sine signis coctionis: quod confirmat 2. prorrec cap. 36. loquens de alvi pertubatione.

Sed in hac dubitatione dicendum est: has symp. thomaticas evacuationes aliquando vtilitatem afferre ægrotantibus, esse que bonas, ve causas: probatur ex Hypp. 3. epidem. part. vbi dixit: in historia eius, qui habitabat in horto, cui sudores per totumcorpus ibant, evomuit, & liquida deiecit, &c. quæ aperte veniunt cruda existente materia, secundum plura sympthomata, quæ ibi reffert, & tamen melius se habebat æger. Expresius tamen illud habeturab Hypp. r. epidem. part. 3. in historia Metonis: hic enim cum habuisset sluxum sanguinis, énaribus, & liberatus est à morbo exibuit Hypp.inter alia remedia in capite aquæ tepidæ valneum, vt evacuationem talem, quantumbis sympthomaticam promoveret: vnde Gal. in commento duo colligit ex przdicta sententia; primum, quod tale valneum iuvat talem evacuationem: secundum, quod vera est Hypp sencentia ex 2. aphorismorum, quæ habet: quæ ducere opportet, quo maxime natura vergit: tamen, quod ex hac doctrina possumus colligere, & ad nostram quæstionem multum reffert, est: aliquando CV2.

37.

vacuationes sympthomaticas invandas esse à meicis. La citation suprobasion and an amount of the

Maxime advertendum est, ita Methonem libeatum fuisse, ex prædicta evacuatione, vt mansisset iber a morbo, sine recidiva, quod satis raro continit: illud enim Methoni contegit, quoniam habuit

alem evacuationem repetitam.

Pro cuius propolitæ conclusionis intelligentia, notandum est, apud Gal. iudicationes in quatuor lividi differentias: quædam enim funt optimæ; aliæ onæ, & imperfectæ: aliæ malæ & confertim interinentes: aliæquidem malæ, sed imperfectæ. Rursus non est idem aliquem morbum esse mali, & pessimi iudicij, quod docet Hypp. 2. epidemion parte 2 cap 4. his verbis. Decretorra, qua non desernant, aut lathalia, aut difficilia. Aliquando enim sequitur mors in talibus decretorijs: in quo eventu morbus est pelsimi iudicij, & etiam contingit disheilem esse iudicationem, quia non per vnam, sed per plures fit lu. dicium, & non omnis est læthalist vnde colligitur non omnes evacuationes sympthomaticas esse malas: nam aliquæ sunt pessimæ, vt syncopales, & omnes aliæ similes, quæ amplius debilitant virtutem, quam minuant morbum, co quod de propria spiritus substantia magis evacuant, quam de materia faciente morbum. Alix vero evacuationes funt sympthomatica, sunt bona, qua minuunt, & aufferunt morbum, vt pote plurimam materix quantitatem Dia evacuantes.

Distinguendum vero est: quænam evacuatione sympthomatica fint bona, & qua mala, iuxta Hyp poc. & Gal. ex conferencia, & tollerantia: conferen tia enim dicitur respectu morbi, quia scilicet auffer illum, & minuit: tollerantia vero dicitur respecti facultaris, quia ita facile fortillam evacuationem, y virtus non reddatur debilier, quam opporteat, ne superveniat aliquod grave sympthoma debilitan virtutem: possumus tamen hæc duo ad invisem se parare: nam tollerantia porest esse sine conferentia vt fi evacuatione facta, per fanguinis missionem, aus aliomodo, supervenitanimi deliquium, tono temporis vacuatio non confert, nec invat; quantum vis dum fit virtus non debilitetur sensibiliter: similites fiquis in principio vniversali febris putridæ copiofum assumat potum aquæ frigidæ; potest esse cum rollerantia, tamen est fine conferentia, & si evaçuatur humor noxior, qui facit morbum, & in ipsa evacuatione anxietates, & inquietudines contingunt, sape licer videre, in calibus minuitur morbus sinc facilitollerantia.
Quia vero dictum est, conciderari tollerantiam

Quia vero dictum est, conciderari tollerantiam respectu virtutis, quando multum non debilitatur, advertendum est: non esse sermonem dequalibet debilitate: nain in omni evacuatione, notaru digna, etiam si conserat, evacuatur quantitas spiritus, cuius, ratione debilitatur virtus, sed inteligitur de maiori debilitate, quam pro tatione evacuationis: hoc er-

1857. Hall 1871. 30

4.15

go przeceptum observandumest, quando in evacuatione sympthomatica plus debilitatur virtus, quam minuatur morbus, autlicevaliquatiter se habeut, sic virtus addeo debilis redditur, vt non superfint vires ad viterius ferendum morbum, tunc emm opportet remidijs talem evacuationem cohibere: vt Galenus docet r.ad Glauconem cap. 13. in sudoribus syncopalibus, & in alviprofluvio, ex quo sequitur animi deliquium: si vero aliter contingat, ve amplius minuatur morbus, quam debilitetur virtus, aut fræqualiter debilitetur, cum diminutione morbi, fi sufficit virtus adferendum morbum, non opportet cohibere prædictam evacuationem: eft enim bona: nec iuvare: quia virtus debilior redditurifed opporter eam finere: fi autem evacuation on lit promultitudinis ratione, tunc opportet ipsam iuvare. Quia vero conferentia, neque collerantia repentur statim in principio evacuationis, sed conterentia post ipsam, & tutius sit medicum cogsnocere:an vtilis futura sit? statim cum incipit opporter inveniri medică aliquod, quo hoc cognoscatur: id autem est ex conditionibus, quæ reperiuntur in bona evacuatione: vt enim talis sit dever sieri per convenienten regionem, in die iudicatorio, tunc etiam devent evacuari qualia opportet, conciderado impetum, & quantitatem na que magno impetu fit, statim facit medicum timere de virtute, & non audet iuvare talem evacuatio. nem si quiem prædictæ conditiones reperiuntur, &

fegniter movet, addet medicus remedia, quibus ta-

lem evacuationem iuvare possit. il amonto male and

Eavero, quæadducta sunt, in principio, facili negotio solventur ad id ex 4. aph or ismorum dicendum est: ibi tantum vicoperare Galenum eas evacua tiones, quæ sunt symthomaticæ qualitate, ita vt non evacuentur qualia opportet: dum vero Galenus in commento dicti textus dixit; incipie ute morbo, nibil tuno vacuari pro ratione natura. Dever intelliginas tura secundum natura ordinem ope rantis. Nam quado natura sic operatur excernit acta coctione, fine qua evacuatio fit propter intempestivam irritationem: quado verovlterius subdit: aliquid bene evacuiri est imposibile; devet explicari, quod talis evacuatio femper fit mala, statim vt fignum: quia fignificat, vel malam qualitatem, humoris, vel excedentem quantitatem, propter quam causam non potest na tura humorem illum detinere, víquequo concoquatur, cum quo stat talem evacuationem posse bonam existere aliquando, cum per ipsam evacuerur pars materiæ facientis morbum, & ex inde minuatur bus, dan repertuation in bona ever ustioner sudram

Ad illud ex 1. de crisibus respondent verum esse se prædictam evacuationem significare illam, aut aliquod illorum; ex quo potius sequeretur aliquado esse vislem, & bonam, quam semper malam, nam si recidivam ostendit, cum hoc præsuponat prius ablatum naorbum, sequitur melius sieri circa ægrorandem

39.

perseverasse: similiter ex eo quod significet morbi longitudinem, sequitur aliquando vtilem esse talem, evacuationem: quia melius est hominem vivere morbo existente longo, quam propter morbi accuatiem, & brevitatem interire; interiret autem ex morbo accuto, si talis evacuatio non succederet.

Si vero dicatur; quod si pars materiæ sacientis morbum evacuatur; porius significabitur brevitas morbi, quam longitudo: quia minori existente materia, breviori tempore sit evacuatio, sed dicendum est; verum esse cæteris paribus, maiorem copiam materiæ tardius coqui: tamen adhuc ex evacuatione illa sympthomatica, aliquando morbum longum sur futurum esse colligimus: quoniam ex ea in principio sacta, denotatur prava materiæ qualitas, vel nimia quantitas, quæ naturam cogit ad evacuationem ante consuetum tempus: vnde si morbus esset in salutem terminandus, sieri etiam posset, vt longiori tempore per maneret; si autem ad malum esset si-niendus, intra brevius tempus siniretæger.

Quod vero dicebat Hypp. 2. de morb. vulgar. de sudoribus lædentibus, non devet intelligi de quavis evacuatione sympthomatica: sed est ibi sermo de sudoribus, qui ea tempestate contingebant: & quando Galenus reddit rationem in commento: quia scilicet sine signis coctionis, sactæ, aut multitudinem; aut malignitatem materiæ signissicant: non devet

PELLE

Quid sit morbus accutus? & an talis habe at a febrem necessario?

Voniam in superioribus dictum est: morbum iudicandum per crisim inter alia cognosci ex magnitudine morbi, & celeritate, quæ duo videntur contingere in morbo accuro: explicare opportet: quis appelletur morbus acutus? & an talis habeat febrem necessario.

Quo ad primum Galenus 2. aphor. sententia 19. docet; illum esse morbum accutum, qui prater quam quod celeritei terminatur, statim magnitudio nem habet. Quod etiam docuit cap. 23. vin accuti (inquit) sunt morbi magni, & qui celeriter ad vigorem properant, & c. 2. de diebus decretorijs 12. laudat Galenus Archig. propterea, quod motu, & natura accutum morbum explicuit: quod etiam 3. de diebus decretorijs cap. vitimo facit: quantum vis 6, epidemion parte 71. cap. 19. accutus morbus ex cele-

40.

ritate motus, omissa magnitudine explicuit, quia ad id de quo ibragebat, non erat opus magnitudinem conciderare. Duo ergo repiriuntur tanquam necessaria in morbo accuto: magnitudo scilicet aliqua ex his tribus, à nobis in superioribus positis, & celeritas motus, vt Galenus explicat 3, de crisibus cap: 4.86 31 de diebus decretorijs cap. 18. quando scilet brevi temporis spatio morbus percurrit tempora vniuera salia accutus est; morbus autem cronicus, seu longus est cardi morus, quia labores, seu accessiones sive symptomata non adveniunt brevi tempore, ex quo fit, et quamvis æger possit interire ex diuturno morbo non tamen talis dicitur accutus, nec proprie periculosus, nam periculosum colligitur ex Arist. 2. rhetor ad Theodectem. cap. 5. est apropinquatio futuri periculi, quod timetur. Vnde periculum devet esse propinquum, nam res quæ maxime distant, non timentur, nec mors, quæ futura est longo temporis spatio: ex quo colligitur: posse esse aliquem morbum magnum, & non accutum, prefertim lifte magnus in essentia: nam cum magnitudine, bene stat tarditas motus; potest similiter morbus brevi tempore siniriabsque eo, quod siraccutus, ve contingit in febre diaria: talis enim proprie appellatur morbus brevis, non tamen accutus; aut diuturnus a tillio

Vnde facile posset quis illam solvere dubitationem, qua quæritur: vtrum sebris tertiana exquisita fit morbus accutus?nam communis medicorum opi-

nio tenet affirmativam partem, exeo quod dictum ab Hypp. 2, prog. cap. 4. dum pedes, & manus frigidæ sunt ventre, costis que calentibus lathala. Inter alia vero, quæ Galenus reffert in explicatione huius sententia, dicit: accipiendas esse illas febres accutas, quæ in principio invassionis habent rigorem, aut refrigerationem extremorum: tales enim sunt tertianæ exquisitæ; go. sunt accutæ, & 3. aphorismor. cap. 29. dum explicar hanc fententiam Hypp. juvembus autem sanguinis spuitiones, febres accuta, morbus comitialis, & c. inquit Galenus non simpliciter accutas febres intelligere (nam aliquæ etiam accidunt pueris) sed tertiana, & causos, tales enim sunt accutæ, & biliosissimæ. Quod etiam ex Avic. colligitur prima quarti, tract. 4. cap. 1. ex accutis valde Sunt spasmus siccus, apoplexia, squinantia, febris vero tertiana, & causos, ex accutis non valde; sed si quis concideret ea, quæ Galenus docet,, convenire morbo accuto, inveniet profecto, terrianam exquifram proprie morbum accutum non esse:nam vt dicebamus de ratione morbi accuti est magnitudo, & quod brevi tempore adveniant pericula, ex eo colli-tur morbum periculosiorem esse. Tertiana vero exquisita est sine periculo, vi pote quia intermitens, si enim morbus accutus non haberet periculum diuturnum, posset sebris diaria dici morbus accutus, quod maxime reddit Galenus 3. de diebus decret. cap. vltimo, & probatur; quia diaria febris posset esse magnus morbus maxime magnitudine essentie, & cum hoc brevi temporel terminaturb gas si desiete abaccuro morbo, ideo essi qui apericulo vacati essi crego periculum abaca terriana exquistra necessario dicendum est, non esse proprie morbum accutum.

Locis vero in contrarium adductis, tantum appellant authores morbum accutum rerrianam exquisitam; non iuxta omnem conditionem requisită; sed solum appellatione a celeritate motus sumpta; quia scilicet sontem sircivitibus rarries ser le service serv

quia scilicet septem circuitibus terminatur.

Ulterius porest dubitarican iuxta tradicam definitionem morbi accuti possit reperiri sine sebre?
quia pro parte negativa videtur Hypp, primo epidemion, parte 3, vbi dixitu morbi maximi accutissimi,
commento asserit; vera dixisse Hyppoc quomodocunque intelligatur continua sebris, sive talis sit sinochus, sive ea, qua accessiones habet, & 10. accutorum cap. 8, recte antiquos appellare morbam accutum phremitidem, & omnem habentem consunctam sebrem continuam air, & c. 18, eiusdem libri
stam sebrem continuam air, & c. 18, eiusdem libri
statuit: hanc esse naturam accutorum morborum.

Sed dicendum estrmorbum accutum posse reperiri sine sebre; id docet Galenus 2. aphor. 19. vbi
apoplexiam, choleram morbum, tetanum accutos
morbos statuit. , & tamen constat sape sine sebre
contegisse Eandem resser sententiam cap. 30. eius?
dem libri, & colligitur ex Hypp. 10. progreap. 21.

-1 F -1 -1 ()

K vbi

vbi dicit bonam respirationem maximam vim habere ad pradicendant salutem in accutis morbis, qui cum sebre sunt; vbi insimuat aliquos esse accutos morbos, qui sebre carent, & idveram viderin nam subject magnitudo cum celeritate periculi, & hac duo inapoplexia reperiantur, & alis morbis su milibus sine sebre, non est cur existimandum sit est timam sebrem inmorbo accuto ne cessario reperir.

Teltimonia vero Galeni, qua videndir pugnare contra hanc partem, ita devet explicari quod in definitione morbiaccuti, cum dicitur esse velocem, non solumintelligitur delocali motu, ita ve quidam morbiaceutivelocemmotumiocalem habeant, ve contingit in apoplexia, in qua humor movem velo civer ad cerebrum, ledictiam intelligi devet de rito? tu alterationis, ve contingit in febre putrida, in qua materia alterationis per coctionem, aut putred? nem movetur, est autem diversitas inter kos motus exparte excrementorum, nam imperoribas hori apu papent figna diverfitatis morns inaltero autem mor borum genereappareon, writing in the fait de iectione. Quando ergordithum fuit ab Hyppoe. & Galen moibos accutos habere conjunctam febrem ? nogelifermo de omnibus in communi, sed de illis panelly aghi habeant lignardiver litatis mutationis itim extramistre iqui vero morbiaccuti poffunte ffebene? demlibri, & colligion ex Happ. 7. prender enil adlar

11/7

Oppor

42

erra Appartier tamen witerins advertere, quoidami ef le morbos peraccuros, alios vero accuros ablolutes rurlys peracentis quidam lunt exacte talles of finit qui finiuntur intra quartam diem: alij peracouti funt simpliciter, & sunt, qui finiuntur septimo die; ho-rum morbarum mentionem facit blypp I deaphop. in illo: phimorbus perascuens off statim extremos hat bet labores, & cateras Peraccitamin morborum simplicites fecis mentionemib. accuracy whi juquit: forbitionem, nes multam, mederaffam, & 6. In priori enim textu illa particula statimo vique ad quartum diem extenditin Acontictia montoibi füt in duplici differentia, quidam funt exacté attati, qui terminantur in decima quanta die ode quibus loqui tur Hyppoci 2, aphor, 23 & suncaccuti sampliciter, absolute, de his meminice deni libro remita, & or prog. cap. 3. alijvero funt accuti ex decidentia i & funt, qui ex accutis decidunt, fape enim contingit accurum morbumincipere, & transacto aliquotent poris spatio amittere aliquid de delectrate morus & prorrogari vitra illius terminum, & hi morbi dizum diem, interift tamesinebiosbxs intopinus

Sed circa hæcduplex potest esse dubitatio. Prisma est; quo pacto dictum he ab Hypp. 2. aphorism. terminum accutorum morborum esse decimum quartum diem, sequidem aliquando extenditur; visque ad vigissimum; quam dubitationem vidit Gal. 2. de diebus decretorijs cap. 12. & repræhendit eos;

qui distruptemorbum acculum in decima quarta disterminario caro autemin vigettima die Respons des ergoalitersnimirum, quod proprie accutus inor bus in quatuordecim diebus reminatur, si autem aliquis prorrogatur ad vigeffimum, ideo contingit, quia habebitaliquam ovacuationem imperfectain prius cuius ratione florente remitri ranta accutles, & proudhimorbus. Vnde videtureontineri libhis, qui dieunturaccutiex dicidemla Anivero poffit effe aliqua ratio ob quam talis accutorum terminus cognoscatur, explicabitur infed luxes mine riorq nl in Secundo responder Gali quod quando dictum fuitab Hypp terminum acquiorum effe decilium quartim diemodeves intellight quod vehementia, & accuries morbinon durent amplius, licet morbits possit dumre dongiori contingation; contingat enimaliquando morbam permanere pluribus diebus, in quibus non estaccieres illa, & colligi porest ex hyppile of iclemion parte 3 in Wiltoria I Teraffini, qui cum laborate o interbol exacte peracento, iqui isbonum, adomainmideverer terminari, antra quar tum diem, interijt tamen quinto die Reddit Elyd Galenus racionem forcommento huius rei admiratus: quia scilicer quantum vis interijsset quinto die mitracien dies quartus accurier morbien un primas dies mothe fair accurtisted mediocirer kgrofans R habaitilid quad confirmatum est experientia Repe enim videmus, transacto aliquo temporis spatio, inhip

• 14 accurus in mortem. Respondenti, quad menibam tayab atoqmas oup & maituaas idrom ariqia - ibam tayab atoqmas oup & maituaas idrom ariqia

cus incipere dierum connumerationem.

Secunda dubitatio est qua ratione terminus mor borum accutorum ex decidentia constituatur, vsque ad quadragessimam diem, vt constat ex Hyppocr. 1. prog. cap. 21. nam videmus sape numero tales morbos in longius tempus extendi, & ita 2. prog. tex. 37. quasdam suppurationes erumpi sexagessima die; & lib. epidemi constat quosdam morbos siniri in sexagexima die, alios vero vsque ad sentessimam extendi. Respodetur ita esse, sicut probat experimentum nec. Hypp: posuisse quadragessimam diem, vt terminum ystimum accutorum morborum, ex decidentia, sed tautum loco exempli positus suit terminus accutorum morborum ex decidentia in illa sententia.

Etiam est advertendum, id quod diximus circa terminum accutorum morborum, non solum este verum dum morbi iudicantur ad salutem, sed etia dum terminantur ad mortem, quia in yno quoque idem terminus est: ita optime colligitur ex Hyppoc. 3. prog. cap. 1. nec obstat, quod diximus 7: aphor. 3. quod quando in vrina est sedimentum, quod reftert farinam crassorem, significat longam ægritudinem, et quod id devet intelligi quando terminatur morbus ad salutem; at vero ex ipso Hyppoe constat, quod quando talis morbus habet hoc signum in yrina, terminatur brevi temporis spatio, tanquam val-

de accutus in mortem. Respondetur, quod mens Hypp. non est morbos his duobus terminis siniri in salu tem, aut mortem, sed tantum, quando vterque per crisim terminatur: si vero aliter contingat, potest sieri morbum aliquem siniri ad mortem brevius, quam ad salutem; presertim debili existente facultate.

morbos in longins remans extendi. & ita eroge te grandi. & ita eroge te grandi. & ita eroge te grandi. & ita eroge eroge en en extendi. Benedi. Exigui in in in execution sobnession songo vigue ad lentessionam extendi. Respodetur ita esse, sicut probat exama extendi. Respodetur ita esse, sicut probat exama extendi.

Voniam in superioribus diximus: morbos in dicandos per crisim cognosci ex specie, magnitudine, emotu: opportet intelligere, ex quo sonte potissimum id deveat cognosci: reffert enim Hyp poc. 1. epidemion parte. 3. longasais enarratione, quantum conserat morbos cognoscere, causas, & sympthomata; possumus autem in morbis cognoscere periculum, essentiam, econstitutionem eorundem. Periculum enim cognoscitur ex multis, ex natura quidem communi; aut propria docet enim Gal I. ad glauconem cap. 1. quod quia non possumus semper cuiusque agrotantis cognoscere propriam, es particularem naturam (id enim melius esset) oppotet naturam communem perfecte cognoscere, vi quo ad sieri possit particularem inveniamus, ita vi quando assectus aliquis est, in quo non solum mas

xime disced e egrotans à particulari natura, sed etia communi; existimare opportet talem periculosum esse, si verò secus minime.

Similiter ex ægrotante iplo pullumus cognosce ie periculum morbi: nam si is, qui morbo laborat sobustus est, & labore patientissimus: modo vero magnopere inquietus, afflictus, & anxietatibus plenus est: statim iudicat medicus: morbum este periculosum; secus vero si ex propria natura, & conditione magnopere conquentur, exqualibet quantuvis minima causa: tunc enim non est cur, quantum ad hoc fignum attinet, existimet medicus: periculosum esse morbum. Tum præterea ex his, quæ offeruntur possumus morbi periculum invenire; nam supponamus plurima remedia adhibita esse in curatione morbi, & tamen non prodesse, nec melius se, habere zgrotantem: merito existimabitur morbus periculosus: si vero paucis, ac levibus adhibitis remedijs minuitur morbus, existimabitur sine periculd Præterea ex offerente; nam quo medicus morbos curans magis peritus est, & in arte versatus, si. non sanatur, judicabitur morbus periculosus

Similiter ex specie morbi; nam quidam ex natura sua sunt periculos, vt pleut itis, & perineumonia: alij sunt sine periculo, vt febris diaria, & catharrus. Opportet eriam cognoscere morbi essentiam, & constitutionem ex rebus naturalibus: ex aere enim ambiente, accedente, victu, ætate, & temperamen. to, cognoscimus: an æger laboret morbo, qui communiter grassatur? Evtrum sit morbus periculosus?
necne? nam si dissimilis est morbus, magis periculosus est, quam si similis extiterit, suxta Hypp. sententiam secundi aphor. 34. vbi ait; In morbis minus periclitantur, quorum natura, etati, habitui, & temporimagis congruit morbus, quam quibus secundum nibil horum convenit.

Præterea etiam exloquælla ægrorantis, & modo ipsius; nam si is ex propria coditione erattaciturnus, & mansuetus; modo vero plurimum, loquitur species est delirij: similiter exmodo, nam si consuerus erat antea de re militari agere: modo vero de re litterali multa loquitur, etiam est delirium, quia non loquitur fecundum rationem naturalem : fimiliter eximaginationibus potest medicus eas cognoscere, non folum ex voce, sed etiam ex signis: voce quidem fræger dicar expelli tibicines ex angulo domi, lignis vt si manu festucas, aut flocos colligat: ex his omnibus licet depræhendere delirium. Tum præterea ex in fomule, dum modo non fint varia, aut tempore coctionis alimenti occurrentia: solent enim plurimum conferre, non solum ad præsagiendum, sed etiam ad cognitionem eorum, que superius diximus, vt licet videre.

Sed dubitatur: an sit necessarium medicum cognoscere morbum, virecte curationem instituat? an vero sieri possit, vi ignorata morbi essentia acte pro-

4933

cedat

cedat in curationem? videtur hoc esse imposibile, hocargumento: quia curatio morbi devet fieri per contraria: sed ignorata morbi essentia non possuint cognosci eius contraria: ergo nec curari minor probatur: quia ignorato vno excontrarijs etiam alterum ignoratur: quam rationem etiam infinuat, Avic fen. 1.cap. 1.vt in codem capite dicit: hignoras, que fit agritudo; relinque cam natura, nam aut sanabit. aut manifestabit ipsam. & fen v. quarti tractiz cap. 7. dicit: & scias, quod imposibile est tibi curare febrems sissi cognoveris eam. Vnde Hypp. 2. accur. 37. docet? inconstantes febres sinere opportet donec constent. Appellanturautem inconstantes febres, que nullum habent determinatum circuitum, & consulie Hypp. noncesse adhibendam durationem donec con-Hent, & cognoscantur carum nature, & cuius sint ratizeed fit pleasing, an perhapancing op. sinning

for Sed quia ve recte docer Galenus nihil ignorare supra captum hominis esse existimave aliquan do-Aninam, seu methodum esse curandi morbos qui no statim cognofcuntur, meliusque agitur circaægrotantem incipiendo cutationem, quam sidésernantur,vsque ad integram cognitionem; nam solet morbus alioquim accutissimus ignorari, & cumplene cognoscitur, iam transacta remedijs occatio est.

Sit ergo certa conclusio: posse medicum commode incipere curationem alicuius morbi ignorata essent ia, vesi dubius est; an homo laboret exquisita Fo

re nephritico, an vero notha? Emiliter; an laboret dolore nephritico, an vero colico affectu, que conclusio, in hoc exemplo, ostenditur à Galeno de locis affeetis cap. 5. voi cum laborasset ipse colico affectu, & vitrea pituita, existimauit nephritim esse, & iniecto clystere exoleo rutaceo evacuate pituitam vitream, cognovit affectonem esse. Quo pacto curabat morbum, quemignorabat.

Ratione etiam probatur: quia difficultas incognitione morborum reperitur inter morbos fimiles: sed tales morbi similes non habent dissimilem curationem in principio: g. licet tunc ignoretur essentia alicuius morbi bene, & recte potest instituti curatio; maior constat, & minor probatur: quia contraria similium morborum, inter se similia sint, quo l'explicaturità: sidubitat medicus: an morbus, quo l'aborat ager se pleuritis, an perincumonia, optime facit si in principio sanguinem mittat; quia issi duo morbi conveniunt; & indicant hoc remedium, ex eo quod commune est virique, non cuique proprium, nec enim postular pleuritis missionem sanguinis, quia est instammatio pleura; sed quia est morbus magnus: magnus: magnus: magnus: magnus:

Methodus ergo curandi tales morbos, qui in principio ignoranturelt, adhibere remedia sumpta andicarione ad id, quod dognoscieur, nilais agendo reiroa id, quod ignoratur, vsque dum manifesterur; escultur siquisdobiret: ammorbus sit nephritis? an

colicus? optime poterit ex hibere ea, quæ vomitum provocant, & clysteres immistere, atque laxantia inedicamenta, & anodina exhibere: nam exeo, quod in vtroque affectu laborent partes intra ventriculum: optime exhibebimus vomitoria ad revellendum: & quia similiter in vtroque supræssa est evacuatio per infernam regionem inijcere præcipimus clysteres, & quia dolor est vehemens anodina conveniunt, & laxantia, qua indicantur ab his, qua funt communia vnicuique ex his morbis: non devemus adhibere víquequo, aliquo figno manifesterus propria cuiusque essentia: nam diurctica medicamenta tunc adhibebimus, quando vrina, quæ tenuis & alva prodibat, exfernitur fabulofa: hoc enim figno depræhenditur in particulari morbum esse nephritim: nec cum datur tale remedium est contra ægrotantem; namilicet in principio cogsceretur essentia huius morbi, non essent adhibenda diuretica; similiter si ignorat medicus: an morbus sit pleuritis, an morbus lateralis ex flactu, optime poteric adhibere fomenta anodina, sanguinis vero missionem prætermittere, nam hoc contra methodum optima curandi. Hypp. enim 4. accutorum fomenta tentavitante missionem sanguinis, ad cognoscendum scilicet, ansit pleuritis adeo venigna, & exigua, vt non poltulet sanguinis missionem, que magnum remedium est:sic enim 6. epidemion curavit pleuritidem absque sanguinis missione, licet à sanguine oriebatur, quia mitis admodum erat.

Secunda ratio ad essertionem probandam siç essertionem indicatio, quæ sumitur à communioribus est prior ea, quæ sumitur ab es quod magis particulare est, ita vr quæ sumitur ab essertia morbi sit posterior in exsequutione, vr patet ex exemplo sebris putridæ: ergo bene potest procedere curatio in principio ignorata essentia morbi, quovsque sit occassio optimæ indicationis, quod sane verum est in-

DOTE TO THE LICE

Curatione regulari.

Tertio probatur; quia essentia morbi magni, & concistentia sunt diversa, & ex diversis habent cognitionem nam essentia ex signis pathognomonicis: magnitudo, vel ex magnitudine corum accidentis, vel ex supervenientibus: constitutio ex brevitate accessionum, autaccidentium, qua sunt cum periculo: g: cum accuties morbi includat magnitudinem, potest cognosci accuties; & magnitudo ignorata essentia morbi, & similiter virium robur; quia huius cognitio potius exactionibus facultatum, quantex morbo dependetioptime erg. medicus ignorata morbi essentia poterit commodum victum instituere, qualis dependetex morbi constitutione, poterit que magnum auxilium adhibere cognita, morbi magnitudine cum virium robore:

Vltimo probatur ex Gull sent lib artis medic. ad cognoscendos morbos sæpe sumitur indicatio autvantibus, & lædentibus, at vero si opportet à

prin

47.

principio ante inceptam cutationem cognoscere morbum, nunquam ex adhibito remedio juvante, autlædente liceret devenire ad cognitionem morbi: vnde non agitur contra salutem ægrotantis, quando medicus de alicuius morbi essentia contendit: nam bene possunt adhiberi commoda præcidia, licer circa morbi essentiam non conveniant; idem autem quod dictum est de essentia morbi, etia de ipfius caula, aut de parte affecta asserendum est, ita ve recte possimus curationem instituere, & incipere licet ignoremus causam facientem morbum, & partem affectam: exempli gratia: potest medicus cognosceremorbum, quo aliquis laborar esse epileptia. quia videt ægrotantem fine sensu incidere, cum frequentibus motibus convultivis, & spuma circa os: ignorat ergo an expituita, velex melancholia procedat, & similiter an talis morbus sit per propriam passionem capitis, aut per consensum cum ventriculo, vel alia parce: nihil ramen obstat quim possit medicusadhibere remedia revellentia, à capite, vt per frictiones, cucurbirulas, ligaturas, & ylterius per lan guinismissionem: quia omnia hæc remedia petuntur ab eo, quod est commune; ralis ergo methodus dever servari in horum morborum curatione.

Quia vero in contrarium obijciebamus: facile possunt solvi dicta argumenta; & ideo ad primum respondeo: verum esse curationem saciendam esse percontrarium, tamen in hoc eventus semper adhi-

bemus contrarium ei, quod cognoscitur, quando autem asserit Avic. imposibile esse curare sebrem, nisi prius cognoscamus cam, loquitur de persecta, & integra curatione, quæ continet omnes indicationes, vsque in vstimam, quæ sumitur ab essentia sebris.

Vnum ramen hic addit author, quod indiget ani madvertione, scilicer, quod si non cognoveris febre subtilies regimen, quod etiam cp. 8. asserit ita: quod se tibi non fuerit conspicua dispositio, que est in ægritudine, melius est victum subtiliare, quam addere; idest opportet detrahere potius de cibo, quam addere, quam sententiam repræhendit Valle. 8. lib. controver cap. 2. ex eo quod institutio victus, secundum tenuitatem : aut/crassitiem dependet ex constitutione morbi: sed non potest hac cognosci ignorata essentia morbi: sedpotest medicus recte in-Mituere: tum præterea, quia morbi, qui dependet ex fluxione humorum postulant in principio tenuiore victum: alij vero pendentes ex materia crassiorem: ergo non potell in vniverlum esle verum, quod si non cognoscamus in principio morbum, adhibeamus tenuiorem victum. Asserit vlterius, quod si aliqua ratione potest habere verum Avic. sententia est non sumpta indicatione a morbo, aut eius causa, à materijs communibus, quæ sunt in ventriculo, & intestinis: vt enim tales per inediam consumantur opportet in illo eventu regimen subtiliare, & attenua-? Hæc re.

48

Hæc tamen interprætatio non videtur consona dictis Avic. quia potius exhibet illis verbis rationem cognoscendi febrem, quæ ignoratur:cognoscitur enim exhibito tenuiori alimento, nam tunc, vt pote causa morbi facta sinseriori, magis augentur sympthomata, ex quibus possumus devenire ad cognitionem morbi; vt si morbus pendet ex bile prohibito alimento magis os amarescit, & præterea si sluit ad ventriculum maioranxietas sentitur, facta bilis acrior, & mordacior, & sic de cæteris.

opportet attendere ea, quæ diximus supra: probavimus enim posse cognosci morbi constitutionem, ignorata essentia, atque adeo recte victum institui, tum viterius licet morbi pendentes ex suxu crasso-rem expostulent victum in principio, quam in vigore, samen bene possumus instituere victum tenuiorem, quam per bonam valetudinem, presertim cum hæc, quæ obijciebat, contra explicationem à nobis

fuperius ad ductum in adhibitione remediorum.

De recidiva, que contingit in morbis.

IN hac virima sectione licet explicare, quod in ter conditiones, quas supra optima crisis possumus: diximus alteram esse, quod sit perfecta: idest minis relinquatur ex morbo: quia alias in recidivam incidit: solet autem circa hac indubium verti: an recidiva sit idem morbus numero cum sua radice, & videtur pars negativa vera: nam co tempore, quod intercedir inter virumque morbum, non videtur labo: rare homo morbo, quim potius morbus prius sinivite ergo non potest esse idem numero morbus vterque; probatur censequentia: quia vnum, & continuum sunt idem: illi autem duo morbi continui non sunt idem dici potest de febribus intermittentibus; an soilicet constituant enodem morbum: nam dic intermissionis, non videtur adesse morbus; quim potius dispositio neutra.

Sed pro explicatione huius dubitationis advertere opportet, duas elle in vniversum causas simplices recidivæ, vel enim quæ ex priori morbo relicta est distemperies, in parte aliqua determinata, v. g. in jecore, quæ paulatim congerat humorem; qui factat morbum; a materia pendentem: vel contingit alio modo, quando scilicet pars materiæ prioris morbi relicta suit in corpore, ex coquod non plene, & perfecte est evacuata, que proportio humoris paulatim

alias partes alterat, ita vi denuo fiat morbus.

Quo supposito, dico primo; quod si ex priori morbo sola remaneat distemperies sine humore, posse sui de vero propter dictain distemperiem siat humor quidenuo sacie morbum, si talis distemperies, qua remanet est siens ex parte ipsus, idem numero morbus est: quia ille, qui sactus est denuo à materia accedente, non solum est distemperies jeconis, aut alterius partis determinata, sed quoda modo a priori videtur diversus, quia non perseverat eadem vnitas causa: si autem distemperies, qua remanet in jecore esse si autem distemperies, qua remanet in jecore esse si autem distemperies, qua remanet in jecore esse si autem causa est diversus, si cuta pud medicos hectica febris est diversa, à qualiber alia sebre forte.

Dico secundo: quod si recidiva contingat relicta aliqua portione materix ex priori morbo, non est dubium, quim morbus se idem numero, quia vnitas, que à medicis concideratur in presenti, ex vnitate cause desumitur, qualis in hoceventu est: falso quidem existimavit quidam: ad vnitatem omnium mor borum sufficere vnitatem cause antecedentis huius falsitas probatur: quia si quis habeat intra corpus quantitatem determinatam bilis, va libram vnam, exqua dimidia quantitas evacuetur, transactoque

M

alio temporis spatio, propter aliquam occassionem altera medietas bilis putrescat, sequitur eundem esfe numero morbum, ac antea; probatur sequela: quia est vna numero causa antecedens: consequens auté est falsum: quia prior morbus omnino suit ablatus, evacuatione totius materia peccantis: opportet erg. ad vnitatem supra dictam esse vnanz causam confinctam, & facientem morbuna ita va portio materia, qua denuo vitiatur in recidiva, non solum valeat morbum intendese.

Ex quo colligitur folutio dubitationis proposiaz dicoenimeo tempose intermedio inter recidivant. & priorem morbum remanere fans remissum. velin toto, vel in parte: ex quadoctrina facile potest dibitatio illa folui, vnde kilicet deveat medicus incipere computationem dierum morbi; an a prima nadice? ana recidiva? & dubiun mon est, quia quando recidiva contingit, relicta parte materiz exprio simorbo, time à primo die radicis dever computatio incipere: siquidem totum illud tempus est vnius morbi, quod deverintelligi, quando morbus, qui lequitur elt einsdem mazerize cum priori; nam tunc revesaeft recidivactecus verofi alterius fit nature: quie reme remporis non el recidiva, sed permutatioinallum morbum; efferantem reciewa, yt fi prionitempore laborabea homo tertianz, & transacto aliquotemporeinciderenintertianam, non autem

hincideretin quartanam, effet enim mac permurado nonrecidive fimiliter fiquis haberer febrem, & incideret in abcessum in aliqua parte, communeratio dierum inabcessunon deverer fiem à die febris, sedadie, quo abcessus incipir: quia est morbus diversus a priori: si zutem esser morbus einsdem naturz, verehaberet rationem recidivz, & compntatio effet facienda a primo die invaffionis morbi. quod colligitur ex Hypp. a. epidemion parte 3, cap. 20. vbi reffert Erophontem laborantem febre arderejudicatum fuisse decima septima die: constatveex historia ipsa fuisse terrium diem a recidiva: ecdemque locodocet Hypp. vxorem liberatum fuille à febri decima septima die, & in recidivam incidisletrigellima quarta indicatum vero fuille morbum octogessima die, & Cleonatem laborantem sebrç herratica continua, liberatum fuile, afferita morbo die septima: ex quibus constat connumerationem fieri ab Hypp, ab ipla radice prima morbi.

Sed alindest, quod advertamus circa hac nimirum dicit Avic. 2. primi mact. 2. c. 20. recidivam deteriorem este priori morbo, à quo procedit: ratio autem est, & concistir in maiori debilitate virtutis: adeo enim timuit viriste recidivam, ve dixerit non esse curandam, quo vsque manisestetur: nam sape inquit esse fara, & tract. 1. cap. 95. air. deserier est residiva, qua velociter, id est brevi tempore post prio

eriei.


rem morbum contingit. Ratio est: quia potentiorem causam significat: tum vitra illa recidiva est deretior, que sine vitto regimmis provenit, quam que cum illo: namilla exinterna causa procedit, altra vero ex exterma.

Sunt autem quadam, ex quibus devet medicus depræhendere recidivant, nam quando morbusimperfecte iudicatus est, ita ve non lit evacuata tota materia: recidivam expectare devet, iuxta id, quod docer Hypp: 2 aphor. tex. 12 gua relinguintur in morbis post indicatione recidivas facere consueverut. Quod etiam traditiple Hypp. 6. epidemion part. 2. can 22. ea autem, que relinquintus in morbis lung, oris amaricudo, cibi faltidium, capicis dolor, corporis gravitas, & alia huiulemodi, fimiliter, quando morbus cuffertur, fine crisi; timere opportet recidivam; est enim præter rationem hoc: tum præterea. quando non au ferturmor bus in die iudicato no, iuxna conditiones optima crifis praditas 3 de crifibus cap. 3. vt opnimæ tradit Hypp. 3. prog. zz. vbi affenie, in quibus febricitancibus febres definisht, nomin diebus decretorijs, aut cum signis solutionis recitliva expectare opportet. Appellat vero figna folutionis, non que tantum figna funt, sed que preter hoc habentrationem caula, vt fluxus languinis e naribus, Indoi, deiectio, & alia fimilia, iuxta quam doctridecinant in diebus imparibus recidivam sequi: idem autem per dies impares intelligit, ac per dies decretorios, eo quod secundum Gal. in diebus imparibus est maior vis, quod etiam repetit 3. prorrec. cap. vit. exemplo posito in dolorious capitis, nec solum id est verum, sed etiam quando morbus desinat, & non in die iudicatorio, propter quam causam quart.

pphor. 19. timet recidivam indicio facto
in die fexto, quibus fatis, superque
facimus tractatu de

* * crifibus.

BRE-



Del Doctor D. Diego Ossorio, y Peralta Medico del Santo Tribunal, y de la Real Carcel: Cathedratico, que sue de las Cathedras de Cyrugia, Anothomia, y Methodo medendi: y al presente lo es en propriedad de la de Visperas de Medicina, en la Real Vniveros sidad, y Protho Medico deste Reyno; conque prueba; con demonstracion, y sciencia, que la enfermedad, que ha padecido el may Rdo P. Fr. Fernando de la Purificacion, Prior del Santo Desierto, no es, ni ha sido lepra, o mal del Señor San Lazaro.

N el año de 1679, en tres dias del mes de Abril fui llamado por el muy Reverendo Padre Maestro Jr. Pablo de Jesus Maria, Provincial de la Sagrada Religion de No

Señora del CARMEN, Emporio de vinud, y letras, y chrystalino espejo de la maior pureza, para que visitasse al R. do P. Lector, y Maestro Fr. Fernando de la Purisscacion Prior del Santo Deservo, à quien la vian curado, y assistido los Doctores mus Doctor.

y de mas creditos, y assimesmo los Maestros Cyrujanos mas experimentados de la Ciudad, los quales
por junta, y visima resolución declararon: ser el
achaque del Rdo. P. mas de Señor S. Lazaro conta
gloso, dincurable, por lo qual se devia deponer, y
apartar de la compañía de los demás Religiosos: el
qual parecer se siguio con grande sentimiento, y
mortificación de la Sagrada Comunidad, por el
amor, respecto, y veneración, que al Rdo. P. Prior

felt deve, y letiene grangeado.

Y reconociendo el sugeto, complexión, contextura, costumbre, o modo de vivir, y la relacion, que su Paternidad me hizo, desde su primer insulto, Sindividual diferencia de tiempo, en la qual tuvo fu enfermedad principio, le pedi tiempo para ver, y confultar con mis Maestros los Authores, y Principes de la medicina, que enfermedad era la que padecia, contemplando como Phylosopho las causas necessarias (con la noticia, que parcicipé de lo preterito) y curaciones para llegar à conocer la produccion, o individuacion de sas efectos. y el presense estado, para socorrer en lo futuro los graves accidentes, que se podian esperar: cuya doctrina enseña Hypp en la seccion 2. Praterita dicito, prasentia cognoscito, pradicito futura, O pracaveto. Y havie do visto los mas graves Authores, y Principes de la Medicina, hize idea de la enfermedad del Rdo. P. Cotto Commence of Colob Hills and The Prior

33

Prior, y halle por sciencia, y demostracion, no ter, ni haver tenido, por ninguna manera, mal del Señor S. Lazaro, y para establecer esta verdad, que intento probar con claridad purissima, que llaman los Phylosophos, sine formidine: assento primero principios ciertos, y evidentes.

El primero sea, que la que llamamos idea de enfermedad se difinine: cognotio realis morbi desumpta à causa, & eius effectu, parte affecta, & samptho-

mate.

El Segundo principio, conque intento probar la dicha proposicion es con sciencia, que difine Aryst.

1. poster; cap. 2. Sciencia est evidens cognitio rei per causam, per quam res ita est, ut non contingat aliter

Se babere.

El tercero principio es la de demonstracion, que llamamos lo cierro, é indefectible, cuya essencia explica Aryst. en el libro, que intituló de Peryhermenias, sive de demonstratione, por estas palabras. Demonstratio est syllogismus faciens scire veritatem, vel demostratio est clara. E evidens reprasentatio. E exprassio obiecti, in quod ita fertur intellectus, ve tollat omnem formidinem. E rationem dubitandi.

El quarto principio es assentar con Hypp. en el libro 1. de los aphor. text. 12. accessiones, & constitutiones, & c. que los signos pathognomonicos deven desde luego aparecer con las proprias enfermeda.

dades, de quienes se llaman passiones: à distincion de los signos communes, de los supervenientes, de los de salud, ó muerte; de los decretorios, y criticos, de los de cocción, ó crudesa: y de manera que valga esta proposicion, ad convertentiam : Datur talis morbus: ergo dantur talia signa pathognomonica: ergo datur talis morbus: y en esto imitamos à los Phylotophos en la proposicion, que vale; datur propris quarto modo; erg. datur essentia, & è contra, sicuti valet; es rissibile: g. estrationale; & è contra.

Veamos pues como se prueba esta verdad en el Rdo. P. Fr. Fernando de la Purificación, por sciencia, y demostración, dejando para lo vivimo el conocimiento real, ò idea, que hize de su enfermedad,

para el acierto de su curación.

Ged hic morbus non est lepra:

ever non est morbus Sancti Lazari.

Major est certa: nam ve asserit Sapientissimus. Felix Plaserius: secerunt hospitium extra sivitatem, proleprosis. Enomenimposaeruntei Sancti Lazari, non quia its tepra laboraverit, seconseribus, Estata quaribus. Minoraucum probatur, ex Gal. 46, 2. ad Claue; cap. nr. & x-meth cap. nr. & lib, de causis, merborum cap. 5. asserberente: lepra est morbus cancer nosus, per torum corpus dissulfussionerdisormitate erg. hiemorbus nonest lepra Huius senrentiz est Sapientis.

54

tistimus D. Fragosius in declarationibus, quest 121.
fol. 334 infra declephantiali, per hæc verba: elepha,
tiasis, quam vocamus morbum Sancti Lazari, est can
ter, sive vnives sa capostematetius corporis, factum
(secundum Gal. doctinam) abbumore, melancholi-

comultiplicate in venis.

Gordianus lib. r. cap. 21. de lepra fol. 24. lepra est morbus corrampeus figuram, & formam, & complexionem membrorum to humore melancholico diffu-Soper totum corpus. Fernelius tenet candem sentenriam, circa difinitionem leprætom. 2. sux pathologiz lib. 6 cap. 19. lepra est morbus venenatus interrene substantia totins corporis naturam immutans, pestilens, & contagios us. Ita similiter Actius f. 730. cap. 120. Mercatus tom. 2. lib. 1. cap. 11. fol. 226. Cornelius Cellus lib. 3. cap. 26. fol. 372. lepra est morbus afficiens totum corpus, ita ve off a quoque vetia ei dicantus, sumanaque pars corporis crebras maculas: crebrosque tumores habeat Matheo de Gradifupra Almanior cap. 15. secunda partis. Alexander Massarias lib. 2. de peste fol. 35. Elephas, sive lepra nihil alind est, gram cancer universi corporis. Et pro omnibus Arabum Princeps Avicennas. lib. 4. fen 3 tract. 3. cap. 1. lepra est infirmitas mala provemens ex spartione cholera nigra, in corpore toto: quare corrumpitur complexio membrorum, & forma i forum, & figura eorum, & fertase corrumpitur infine etus, ipforum continuitas, ita ot corrodantur membra, & cadant &c.

Y para que los Cirujanos romancistas entiendan esta demonstracion: la pondre en leguaje castellano Toda enfermedad de Señor San Lazaro es lepra, la enfermedad del Rdo. Padre no es lepra:

luego no es mal de Señor San Lazaro.

La mayor es cierta; la menor la prueban Galeno, w los demas Authores, que he citado, en los lugares referidos, los quales rodos concuerdan en dezir, v definir la lepra por estas palabras: ta lepra es vnaenfer medad cancerofa diffundida por todo el cuerpo con difor midad, oca sionada del humor melancholico, ò atrabiliario: esta definicion no se halla en el Rdo Pa die Prior: lucgo no se halla lo definido, que es la lepra. La demonstracion serà mas evidente probandola con la sciencia, que es: on evidente conocimientodela cosa: proponiendo los signos proprios de la lepra, dejando aparte los communes, que llaman los authores: comeson, granos, ò tuberculos en la cara, o en orras partes del cuerpo, manchas, pustulas, hinchasones, caimiento del pelo, y otras semejantes, las quales se llaman communes, por haifarse en el morbo Gallico, en la destemplansa de higado, vasfo, o ebullicion de la massa sanguinaria dippuritiva: ch la qual la naturaleza fuerte separa lo espumoso, y escrementicio del centro à la circunferencia del cuerpo, lo qual enfeña Hyppoc. en el libro z. de losaphor. text. 15. Vbi fances agrotant, aut inberenla nascuntur in corpore, & c. Y para assentar los signos

proprios de la lepra, si se hallan en el Rdo. Padre serà bien saber las methaphoras, con que se explicala lepra, llamandola los authores, y Galeno Elephantiasis, Satiriasis, y Leontiasis. 1039 CV 2500 de nol

En quanto à lo primero lla marse Elephantiasis por la semejansa, que tiene la lepra en el Elephante; pues assi como entre todos los animales no se da orro mayor: affi la lepra porlo incurable entre todas las enfermedades, que padece el hombre no parece, que ay orra mayor por lo horroroso, pestilente, y cotagiolo: de este sentir es Accio en el libro cirado, el qual profigue afirmando, que no solo se deve llamar Elephantiasis por lo referido, sino tambien por la lemejanfa en la asperesa de la cutis cuias palabras son las siguientes: Elephantiasis quidem à magnitudinei, & diuturnitate affectionis nomen accepit. El Doctor Felix Platero en el temo 1. cap. citado dize: nos vero, quod aures ipsorum patula, & lata, alarum insta facta Elephantis aures aliquo modo exprimat, sic der nominatam potissimum fuisse credim us, & leprosos dcimus obcutis scabritiem.

Dizece tambien Satyria sis, por la malicia, y defhonestidad del Satyro, por la diformidad en la cara, y principalmente en los musculos de las mexillas, en los quales aparece retraccion à manera de convulsion: assi lo pinta Accio en el libro citado por estas palabras; Satyriafis vero lepra dicitur, proptera quod mala faciei ijsdem cum rubore attollantur, &

musculis maxillaribus veluti convulsionem, patientbus, quem admodum etiam ridentibus evenire solet, similitudine quadam ad pycluras Satyrorum. Y por lo deshonesto prosigue haziendo pariedad à los vapores calientes, que la mala qualidad desa lepra engendra instimulando à los que la padecen à la desho nesta Venus, por las palabras siguientes. Quin, Esalacritas vehemens ad coitum ipsis leprosis adest.

quemadmodum, & de Satyris fertur. Dizece tambien Leontiasis por el tumor laxo, desigual, y flexible à la semejansa de la frentedel Leon, con aspecto grave: Leontiasis autem appellatur (prosigue Aecio, y los demas authores citados) quans frons agrorum cumquodan tumore laxior redditur ad similitudinem pellis flexilis superciliorum Leonis; y. en toda esta doctrina por merhaphoras, amplificaciones, y anthonomacias de la lepra concuerdan todos los authores, que llevo citados, aun hasta en las mesmas palabras, de cuyas d'octrinas sale, por consequentia evidente, que el paciente de lepra hade tener similitud con el Elephante en lo levantado, y avierro de las orejas, y lo escabroso de la cutis: con el Satyro en lo rediculo de la cara (lo qual enseña Calepino) con retraccion de los musculos de lasmexillas, con gesto de risa, con diformidad en pies, y manos, con ardores internos, que provocan al defhonesto aperito: tendra fambien semejansa con el Leonen las diformes rugas, y levantados tumores

de la frente, y fejas, com no poroches col solo sob

A ora pues el que tiene entendimiento solo, que dixo Aistoteles ser: omnium virtus rerum cognoscitiva: y en fin folo con la phylosophia natural, haga aplicacion, o comparacion, por conocimiento iniuitivo, que es el scientifico, conel Rdo. P. Prior: como es lemejante al Elephante teniendo la figura de la oreja propria, y natural? como lo escabrolo de la cutis, con lo muelle, y templada humedad al tacto, en todo su cuerpo? con el Satyro no se compadece, vna cara honesta, y apacible, compuesta del agrado, y de la vniformidad de partes, que la componen: no con los pies, y manos iguales en la recta composicion de la devida figura, número, sitio, y magnitud, con el devido orden en los movientos voluntarios: no en la deshonestidad, por los vapores subtiles, y calientes, que engendra la sepra, que insti mula el acto venereo, pues fiendo preguntado, por la gracia de Dios Nuestro Señor no ha tenido estimuloniaunen sueños y mucho menos con el Leon, pues'en lo dilatado de la frente no fe hallan turnores, ni levantadas rugas, y menos en las sejas, pues riene la forma connatural, y devida à la contextura, y edad de su cirerpo, y solo se hallaràn algunos tuberculos, que la naturaleza provida, y fuerce, como espuma, d excremento de la sangre arrojo del centro à la circunferencia, como despues dire en la idea de la enfermedadyfiguiendo aora de la doctrina referida

de todos los authores, los figuos parhognomonicos, ò proprios, que son los figuientes, fuera de los referidos.

Fetor en la respiracion, el color denegrido, varices, ò hinchasones en las venas, que estan debajo de la lengua, los labios alsados, gruesos, duros, denegridos, à cardenos, à causa del calor interior, que abrasa los humores, y los engruesa, como haze el Solàlos de Africa, y Berberia, y assi mesmo consumidos los murecillos de las manos, principalmente entre el dedo pulgar, y el indice: sueños interiores es pantosos, pareciendotes, que venálos demonios, culebras, cuebas, sepulturas, y cuerpos muertos, por causa de los vapores malignos, que subenà la cabeça, los quales lignos pathognomonicos, ò demonstrativos del Mal del Señor San Lazaro, no se hallan en el Rdo. P. Prior, pues el primero parlando con su Paternidad, y hablando muy de cerca, hasta juntar muchas vezes mi rostro con el de su Paternidad delante de otros Religiolos, para quitar el abusso, ó sospecha, de que pudiera haver contagio, no he perfevido fetor ninguno, ni otro accidente; en quanto al color es el proprio de su naturaleza, y complexion; he registrado assi mesmo la substancia de la lengua, que es à donde mas se manifiesta qualquiera mal del cuerpo humano, assi por lo espongioso, como por la comunicacion, que tiene con todas las partes naturales: como lo enseña Hypp, en el libro 6. de las epi-

87

demias. Seccion 5. texto 12 lingualorium significare, Ta, à donde he hallado el colornatural, fin varices, ó hinchafon en las venas: y affirmesmoles labios en a proporcion de hombie sano, como tambien las manosiguales dinimpedimento en los movimienros voluntarios, y lo que mas es tener los sueños apacibles, y de notable descanso, lo qual es imposible en el leprofo, como consta de Arvstordes, el en lib. 2. dehystoria amimal cap. 27. donde dize: famus est requies facultatis animalis, obstructo leviner cerebro, a vaporibus suavibus, & levibus, ex alimento. La qual definicionno sepuede verificar en el teproso, pues nopueden sobir vapores suaves de las entranas, al celebro, y affifiendo malignos, y venenofes engendran sopores, y sueños eurbulentos, y para prueba de lo referido es de advertir; el bueneperito alcomer, y beber, esto es à sus horas, y sin fastidio, nidemasià, de donde se infiere por sciencia, y demonstracion, que el Rdo Padre Prior no à tenido causas productivas del maldel Señor J. Lazano, y configuientemente miseñales proprias, y masquando se experimenta la cura empirica, que se hizo con el Rdo. Padre Prior, cortandole, y martirifandole violentamente, los tuberculos, dejandole despues vnas heridas, ó llagas frescas, y cruentas, y estas sin venirle inflamacion, ni otro accidente, la prepria naturaleza las encarnó, y cicarcilò, y li fueran delepra cra esto imposible, porque avian de ser necessa-ILA. riamente los tumores cancrofos, de cuya extirpació fe feguirian inflamaciones, calenturas, y fluxos de fangre, y avezes la muerte, como consta de Hypp. en el Aphor. 28. del lib.6. Cancros ocultos melius est non curare, curati enim cito pereunt, non curati longius tempus perdurant. Esta verdad en el mal del Señor San Lazaro enseña Calepino sobre el nombre Elephantia sis, por estas palabras: rationem huius nominis refferunt ad Elephantis naturam; cuius cutis elseros quibus dam vallibus infestatur differt acancro, quia hic partem corporis depascat, elephantia

veroper totum corpus diffundatur.

Y no puedo dexar de annotar lo que el Sapp, mo Doctor Fragoso dize, y advierte en sa declaracion, y examen del leprosoen el fol. 497. y es à saber: que haviendo tratado de varias declaraciones, solo en la del leprofo dize estas palabras: el Medico, à Cirujano, que declarare de la lepra, enfermedad tan fea, abominable, y contagiosa, conviene estar muy atento acersa de fus fenales, prevolver vna, y muchas vezes por ellas, yno fur se de junão de pocas, fino de muchas, y conciderar, que mas de ellas son mas proprias, y essenciales, que ne sessariumente figuen al mal. De donde infiero ser muy factible el poder se engañar en la declaracion del mal del Señor San Lazaro, como lo dize el mesmo Hypp, en el libro 5. de las epidem. tex. 9. por estas palabras, que parecen fingidas paraelcaso. Athenis homo pruvitu tenebatur toto cor-Serie 1

87

core, præcipue autem testibus, & fronte: tenebaturautem admodum vehementer, & cutis crassa erat, secundum totum corpus, & vlant sepram habens as estu, & nulla exparte potuisset apræhendere cutem præcrassitudine, bunc nemo invare potuit, & c. sandose solo en los signos coinmunes, y mas quando el conocimiento del hombre es tan simitado, como lo prueba el Physosopho por esta demonstracion: hominis cognitio incipiens à sensibus est fallibilis, & simitata; sed omnis cognitio hominis incipit à sensibus: ergo omnis cognitio hominis est fallibilis, & simitata.

Siguese pues la idea, y conocimiento real, que hize de la enfermedad del Rdo. P. M. Fr. Fernando dela Purificacion, y esen esta forma: diò su Paternidad en vsar bebidas, y alimentos demasiadamente calientes, y siendo de temperamento caliente, y humedo, se hubo de destemplar el higado passando à excesso de calor, y criando a su semejanza humores adultos que obstruyeron el vasso de manera, que detenidos, y melclados con los demás humores en las venas (que llaman los medicos massa sanguinaria) hizieron evullicion, y la naturaleza fuerte, y provida separò lo vtil, de lo inutil, dipurando, ò purificando las entrañas, arrojando del centro à la circunferencia lo excrementicio de la sangre, y lo que se havia de exalar, y evacuar por sudor, ò por insensible transpiracion, assi por la dureza de la cutis, como por el aire ambiente, que era frio, por ser en el

nigor del hybierno, quando se empeso la enferme. dad, se quajó, à empaniso en sorma de botores, à tuberculos en la cara, en los brazos, y parte de las piernas, los quales tuvieron crecimiento, por la faira de eura, que el Rdo. Padre uvo en la primera invació; que fue con gravissima calentura, ancias, y farigas, vigilias, y comeson en todo el cuerpo, y como me refirió la Paternidad, halta que le fangraron copio: famente no suvo alivior de donde se siguio; que los humores, que quedaron derenidos, y no evacuados, por la naturaleza, o por el arre viciaron mas el higado, y vasto, y por la obstruccion, ydestemplanzas distincraselhigado, y vaffo han fido las partes affectas, y haviendole quejado de gravedad, y tencion emel vasso conoci ter cierta la obstrucción, y en esta parte haver renido el mayor principio, y fomento la enfenmedad del Rdo. Padre, pues siendo receptaculo del dumormelancholico le éle difundirle, à por debilic dad del proprio vasso, que no le atrai, ò por obstruccion, que impide el transito, o por multitudad, que criael higado, y no puede recebirlo: y figuiendo el ta idea, y conflinacion de firenfermedad hi fido Dios nueftro Señon fervido fe ava acerrado la cumcion, - cuyo acierto lea para mayor gloria luyar obrandis

De Adwirtiendolo querefiere el Doctifimo Doctor Manno de Ribelro, en lus oble reaciones communicatas e que le focedió les Erascis con en communicata en la padecia en la contra con en contra la contra padecia en la contra con en contra contra la contra la contra contra la contra la contra contra la contra

2.3

tenso tubor en el rostro, conmuchas, y varias postilla s, que la dehonestaban, para cuya curacion se llamaron samosos, y grandes medicos, los quales no la pudiero sanar, y haviendo llamado al dicho author la sanò persectamente con sos remedios, y regimen, que en la dichahystoria resiere: de donde insiero, que assi las curaciones, como otras obras grandes, suele la divina Magestad para consusson de los sabios, dejursas para los pequeños; o ignovantes como yo: palabras son del giorioso San Pablo, en el cap. 1. Epist. 1. ad Corint; sinlta Dens elegit, et confundat sapientes. Y San Matheo en el libro de sus Evangelios cap. 1. Consitebor tibi Domine, Pater Cali, & terra, qui a abscondisti hava sapientibus, & prudentibus, prevelassi en paroulis.

De cuyo discuso se signe el deseanto, el consuelo, la compania, la comunicacion, el gozo, de estar
el Rdo. P. Prior con sus queridos hermanos en el
choro, en la mesa, en el puesto, en el govierno, y no
como devià, y deve estar el que es verdaderamente
leproso, cuyos castigos dispuso Dios nuestro Señor
en el Lavitico cap: 13. por estas palabras: ille, quilepra maculatus est à societate aliorum deve at este divissus, Es separatus; Es habere vestimenta dissuta, caput nudum, os veste contectum. Es solus extra castra
havitare. Y jusqo, que el haverse engañado hombres
tan doctos, y eminentes en el conocimiento, y deter
mideixon de la caste medad del Rdo. P. Prior, sie-

disposicion divina, para mortificarlo: el qual se deve restituir à su Priorato, y obtener todos los puestos, que la sagrada Religion le diere, por que de lo contrario siento, como Sacerdore, y Confessor General gravissimo cargo en la conciencia, y materia de restitucion, con bastantes circunstancias, como son atrasar vn sugeto de tantas prendas, y veneracion, no solo en el puesto, que obtiene, sino tambien de los que puede obtener, y hazerlo assimelmo aborrecible, y despreciable: y de ser verdad el no tener, ni padecer mal del Señor San Lazaro el Rdo. P. Prior fr. Fernando de la Purisicacion (pospuesto todo odio, amor, y temor) delante de Dios nuestro Señor, que

à la hora de la muerte nos ha de pedir

* * estrecha quenta, lo juro in verbo * * *

Sacerdotis. * *


The state of the s

มี มีรายุกายนาชี (อาเมือง **หน**ันเกา การเกษณา รูป์ เชื่อง

on a proposition of land, we have a few visit of the color of the colo

Charles of the Control of the

ANO-



ella, sciencia adquirida por raciocinacion demonfarativa, por doctrina, y estudio de los libros, que es la theorica, y por la practica, que da conocimiento à la manual operacion por la experiencia de los cuer pos, que commos segun Galeno, y rodos los demas Authores.

Authores.

QVANTOS PROVECHOS

se siguen de la Anothomia?

Vatro son los provechos, que se siguen; el primero alabas la Omnipontencia de Dios Nuestro Seños, vista la fabrica, y composicion del cuerpo humano, el Segundo: conocer los miembros en su natural sanidad, y contextura, ó si padecenalguna lecion, ó enfermedad: el tercero; pronosticar por este conocimiento lo que puede venirles; el quarto; curarle como suere posible. Segun Galen. de placit, Hyppoc, cap. 8.

QUE ES CVERPO HUMANO!

C Verpo humano es vn todo adornado de muchas, y diversas partes dotado de razon, y es de mas noble forma, y maravillosa organizacion, q ue todos los demas animales, porque en el assiste el Anima racional divina, y eterna, criada à semejanza de Dios Nuestro Señor, principio de muchas, y diversas operasiones, por lo qual sue necessario, que sueste el cuer po compuesto de muchas, y diverse el cuer po compuesto de muchas, y diverse partes. Es que Guid lib. de Anothomia.

OVE

o miembro del cuerpo?

Es aquella, que tiene sierta circumscripcion, o forma ajuntada con las otras partes, tales quales convienen à la vida humana, porque separada, o cortada no se deve decir parte, porque el dedo junto con la mano, y la mano al braço, son partes vuidas, yassi de las demas segun Calvo libro 6. de Anothomia, por Galeno lib. de la vtilida d de las partes.

SISEAN ESTAS PARTES funples, o compuestas?

A y partes simples, y ay partes, ó miembros compuestos, los simples son diez como se siguen.

CUERO, \$ CARNE, HUESSOS, CARTILAGOS, LIGAMENTOS, \$ CARTILAGOS, \$ CARTILA

TELAS, CUERDAS, NERVIOS, VENAS, ARTERIAS

Algunos añaden pelos, y vñas, pero los mas Authores los tienen por excrementos como lo son.

P que sino QUE

QVEES MIE NBRO

M lembro simple es el, que dividido en partes es siempre semejante al todo, como vn nervio, vena, ò huesso dividido en muchas partes qualquiera de ellas es se mejante a todo el nervio, vena, ò huesso segun Gal. Frag. y Calvo lib. 6 de Anothomia.

QVEES MIEMBRO compuesto, d'organico?

M lembro compuesto, ò oraganico es el que dividido en partes ninguna dellas queda semejante al todo, como el dedo, la mano, ò el ojo, que no se pueden dividir en otros dedos, otras manos, ni otros ojos: segun Calvo lib. de Anothomia.

SI LAS PARTES,

o miembros simples tienen un mesmo temperamento, o sile tienen los compuestos:

mento, o si le tienen los compuestos?

Notienen porque vnas son sanguineas, que son calienres, y humedas como la carne, musculos, y murecillos, y otras son spermaticas, que son sias, y secas como venas, arterias, huestos, carrilagos, telas, nervios, y ligamentos: segun Calvo libro de Anothomia, cap. 1.

CO-

conciderar el temperamento de todas las partes del cuerpo?

Hase de conciderar del temperamento de cada vna dellas, el qual se haze de la mixtion de las quatro qualidades de los elementos, que este es la sorma substancial de las partes similares primeramente, segunda se deve conciderar lo que se sigue al temperamento, como es duteza, blandura, raridad, denzidad, crassitud, y tenuidad: tercera conciderar la figura, la magnitud, el numero, y el sitio; la quarta conciderar la accion de cada vna si es propria, o comun: la propria es la que no se halla en otro miembro, como el ver, que es propria accion de los ojos mediante el humor cristalino: del higado convertir en sangre el chylo: del coraçon, purificar la sagre, y hazer spiritus vitales en el siniestro ventriculo: del cerebrohazer spiritus animales de los mitales: del estomago cocer el alimento, y hazer el chylo:

La accion comun es en dos maneras, ó se dize comun porque se halla en todas las partes, ó miembros similares, como la facultad atractrix, retentrix, concoctrix, y expultrix: ó se dize comun por que lleva alguna cosa comun à todo el cuerpo, como los nervios, la censacion, las venas, la sangre, y las ar-

arterias la sangre vital: segun Calvo lib. 1. cap. 1. de Anothomia: y Galeno libro del vso de las partes.

la cabeça, y quantas partes tenga?

I lene la cabeça partes continentes, y contenidas, las cantinentes son cinco.

ELCUERO, SEL PERICRANEO, LAGORDURA, SEL CRANEO, LAMEMBRANA CARNOSA,

El cuero en dos maneras, verdadero, y no verdadero, el no verdadero se llama epidermis, criado de las superstuidades del verdadero, que facilmente se desuella.

El verdadero se llama dermis, raro, y pososo, al qual se le comunican cabos de venas, nervios, y arterias para su conservacion, y sentimiento, es templado en su complexion, sirve de vestidura à todo el cuerpo para su honestidad, y hermosora segun Calvo lib. 11. de Anothomia, y Galeno libro de temperam. cap. 19.

In gordura es a modo de afeite elado engrendrafe de la parte mas gruesfa de la sangre exalandose de las venas en las partes, o miembros frios, se conjela donde ay calor, ay muy paca, sirve de extenderse por las telas, y partes nerviosas, para que h umedeciendolas conserven el calor natural; carece de sentido se-

gun Gal.lib. de temperam. cap. 192

La tela, ò membrana carnosa es de media substancia entre carne, y tela compuesta de venas, hebras, nervios, y carne, sirve de vestidura interior al cuerpo para guardarle de algunas alteraciones, que le pieden venis segun Galeno libro de Anothomia.

El pericraneo es vna tela gruessa, y nerviosa, que cub e los huessos de la cabeça, ata los musculos temporales, y los cubre, nace de la dura mater, sirve de tenerla colgada por medio de vnos ligamentos, que entran, y talen por las comisuras en la cabeça, se llama pericraneo, y sobre todos los huessos del cuerpo periostron, es miembro simple, y spermatico de complexion sria, y seca, segun Calvo libro 1. de Anothomia.

El craneo es compuesto de ocho huessos, que tie ne la cabeça, el huesso es miembro simple, y espermatico de complexion fria, seca, y terrestre, los ocho huessos son: coronal, los parietales, los petrosos, el

occipital, bacilar, el cribrofo.

El coronal en la parte delantera, los parietales, estànà los lados como paredes, los petrosos detras de las orejas duros como piedra, el occipital en la parte posterior, el bacilar fundamento de la cabeça, el cribroso es de las narices porque tiene ahugeros, co-

mo cribra: segun Frag, y Calv. lib. 1. de Anothomia.

Estos huessos juntan por medio de cinco co misuras: tres verdaderas, y dos falsas, llamanse verdaderas porque se ingieren entre si como dientes de sierra, la primera sagital, la segunda coronal, la tercera occipital: las dos falsas se llaman assi porque estan vnas lobre otras como escamas de pescado, tienen sinco vsos, ú oficios: el primero: por que si dies. sen vn golpe en vn huesso, no pasase al otro, el segun. do: para que expurgen los excrementos del cerebro, el tercero; para que esté substenida la dura mater co el pericraneo, el quartopara que se comunicassen las medicinas de la parte exterior, à la interior, como se haze en la frenecia aplicando el oxirodino, el quin to: para que se dilatassen en los idiosephalos, que se hazen debaxo de los huessos de la cabeça, todos los que los padeciessen se moririan si no huviera estas comisuras, segun Calvo, y Fragosolibro de Ano-

thomia.

LAS PARTES

contenidas, son siete.

MEDVLLARGED \$7.PARES DE NERVIOS

DURAMATER, STRED ADMIRABLE, PIAMATER, SCLANDULA, SUBSTANCIA & HUESSOBACILAR,

La dura mater es vna tela gruessa, y nerviosa, que cubre el cerebro, y el huesso por la parte de aden

tro, y està adherente, ò continua à el.

La pia mater, es vna tela delgada, y nerviosa entretexida de venas, y arterias, de venas para sustentar el cerebro, de arterias, para llevar spiritus vitales para que de ellos haga spiritus animales; sirven estas dos telas de cortinas entre el cerebro por ser blando, y el huesso por ser duro, y cada vna da vna tunica à las partes, que toman principio del cerebro, segun Calvo lib. de Anathomia.

El cerebro se divide en mayor, y menor, el cerebro mayor es la substancia medullar blanca, blanda, y molle, tiene tres ventriculos, en los quales dizen todos los Authores assisten la memoria, el entendimiento, y la voluntad, y es archivo de la razon. El cerebro menor, o cerebro tiene como dos nalgillas no tan blandas, ni molles, como el cerebro mayor, en medio delas quales està vn cuerpo calloso, que las divide, es miembro principalissimo, principio de la virtud motiva, y sensitiva, y donde assiste el anima racional, tiene facultad propria de hazer espiritus animales mediante los siete pares de nervios, que toman principio del, y dan spiritus vissivos à los ojos, gusto à la lengua por ser compuesta de muchos nervios, al oydo mediante el quinto par de nervios, que wienen à los oydos, al olfato mediante estar el huesso

crivoso horodado llegan, y entran los olores, y dan en los dos processos mammillares, que son como vuos pezoncillos, que nacen de cerebro junto de onde nacen los nervios obliquos, y están puestos junto al huesso crivoso, y en ellos se tiene luego la fragancia: segun Calvo, y Fragoso traido de Gal. 1.8. de crit.

La red admirable, ò rete mirandum, es vn pleko hecho de las arterias soporales, que entran en el cerebro menor llevando spiritus vitales para que de ellos haga spiritus animales; veese mas bien en los animales grandes, y llamase rete mirandum, porque para verla es menester mucha antencion, y muy clara vista, Hidalgo la niega, y todos los Authores la traen, como Fragoso, y otros.

La glandula, que recive la pituita es como vna mollexuela que cae sobre el huesso bacilar, la qual tiene vna cavidad pequeña en que recive lapituita, ó slema, y la naturaleza hecha, y expurga al huesso bacilar, y se evacua por el palato: segun Calvo lib. x

de Anothomia.

4-30

El huesso bacilar sirve de fundamento, y baza de la cabeça, està en la parte posterior, y mas baxa de ella, distinguese de los otros por las comisuras de los petresos, y por las comisuras de los parietales: segun Calvo en el cap. 30 de los huessos.

De los siete pares de nervios el primero lleva spiritus vissivos à los ojos, nacen de la parte delantera

65.

del cerebro à los ojos, el detecho al ojo derecho, el izquierdo al izquierdo, y se juntan en medio, para que estuviessen más sirines, y para que facilmente no se pudiessen romper por ser blandos, y guecos, som mas gruessos, que todos los del cuerpo, por su oquedad baxan los espiritus animales con la facultad de ver, y por donde baxan los espiritus, y suben al cerebro las especies, y colores de aquello que vemos, senecen en los ojos en el humor vitreo.

El segundo a los musculós de los ojos para su sentimiento, y movimiento vintendo el derecho al ojo

derecho, y el izquierdo al izquierdo. 19 0 13001 1 35

El tercero à la frente, à las sejas, à los musculos temporales, à los dientes, y à las muelas para su sentimiento, de los quales la tunica interior de la lengua se haze por ellos, y por ellos viene la facultad de gustar à la lengua.

El quarto à los musculos de la lengua: fenece en el paladar dandole sentimiento, convirtiendose en muchos ramos: Realdo Columbo dize, que por este par le viene alpaladar alguna facultad de gustar: mas Calvo lo siente al contrario.

rebro la facultad del oyr, y Calvo dize, que falen afuera, y se destribuyen en muchos ramillos, que vienen à los musculos de la cabeça.

El sexto baxa à las dos cavidades natural, y vital, y se vnen à la trachiarteria, y baxan al pecho, o toraz, y de alli salen dos ramos, vno de cada nervio, y suben, y fenecen, en los musculos de la meringe, ó nues, y à las demas partes, que forman la voz por las quales viene la facultad de hablar, y formarla: baxa à la voca del estomago dandole muchos ramos, que alli fenecen, y luego baxa à ramisicar el higado, el vafo, los riñones, la vehiga de la hiel, la de la orina, la madre, y demas partes inferiores. de est orderes la

El septimo par à la lengua, y à la nuca, à los mufculos de la quixada, ò mandibula de abaxo, y aun à los musculos de la lengua; segun Calvo en el libro 1. de Anothomia, cap. 39, de los nervios, que salen

del cerebro.

las partes del rostro?

#25 (TO JOS, 5) FRENTE, Stobase AS, our sing med Stob NARICES, ma gouer SIENES, la gio Sobles A : BOCA, lour as erading she heele and a OREJAS land a maivel rig offe

Las telas de los ojos, o tunicas son seis, la primera de afuera adnata blanca, y delgada, y nace del pericraneo, y acaba en el circulo mayor del yris, donde se encuentran todas las tunicas del ojo adornado de diversos colores. soodas al abadustam so, eneneir,

La segunda fecundina, que se forma de los cabos delos muricillos, que mueven el ojo del anne de Pial.

66

La tercera es la cornea, de la qual toma su forma el ojo: porque le rodea todo: reluciente, blanca, y dura por delante, y por detras, no tan reluciente, y mas dura, nace dela dura mater. Pollmon achibiang

La quarta vbea, que nace de la pia mater envol-

viendole en el nervio optico agal de que la la la

La guinta retinea, que nace de la substancia del

nervio optico. I ar aq anolare pen oiro est est

La sexta aranea, que nace de la pia mater, tambien està compuesto, y organizado de tres humores diferentes en labstancia, lugar, quantidad, y figura, que son albugineo, cristalino, y vitreo, que juntos hazen vna figura redonda.

El albugineo es de substancia rara, como clara de

huevo: es en mas quantidad, que el cristalino.

El cristalino es de mas gruessa substancia, como cristal, y de figura ovada, y pequeña: vnidos estos dos hasta la mitad del vitreo.

El vitreo es semejante al vidrio, y mas condenzado, que los otros, y demas quantidad, que el cristalino, hazia la parte interior por donde vienen los nervios opticos, que vienen por debaxo del primer ventriculo de la substancia medular.

El albugineo està entre la adnata, y secundina, y cornea, y el vitreo entre la cornea, y vbea, que todos juntos hazen vna figura redonda, instrumento de la vista, que los puso la naturaleza para atalayas del cuerpo, con particular providencia, criados dentro Andres de Leon compuesta de ocho huessos que coponen esta redondes, ò cavidad, para que sueste guardados miembros de tanta estima; puestos en la cabeça, y en lo mas alto, para que sueste de todo el cuerpo: segun Calvo lib. de Anotho mia, capitulo 2510 al abasante a anotamentima.

Capitulo 251 al ab acent up a suita resteiup a l Las sejas las criò naturaleza para hermosura del ojo, y los parparos para custodia dellos guardandolos de las alteraciones, que les pueden sobrevenir: ?

Las senes para hermosura del rostro, y su sustoda, y para que pasasse el quinto par de niervos por vn ahugero ciego, que està en el huesso de la frente al del oy do, en ellos se divide el huesso coronal de los parietales.

los parietales.

La frente compone con hermosura la cabeça, y rostro, que es el huesso coronal, aquien llaman algunos huesso coro: es mas duro, y mazito, que los parietales sacada la parre de la mollera, que es mas delegado, y algun tapro raro.

gado, y algun tanto raro, reme by sorte sol sup ob Las muricer fonexputgatorios de la flema, o pir tuita, que en los venniculos del cerebro fe llega, que de no exputgar fe à las partes de afuera fe figuieran nuclus, y graves en fennedades: y para que entrafe elayre, y los olores por ellas, influmento proprio del oltro i conoca acual nuclus naces sociales de la figura de la figura

23 La boca, para que le finitelsen los manjares en el 2000 para que le bizielle en ella la maxiscación me

67

mediantes las muelas, que algunos dizen es la primera digestion de los alimentos; para que por ella
entrase el ayre, que inspiramos fresco, y el que respiramos caliente, y para que por ella, y el palato se expurgasen muchos excrementos; y para otros insichos sines; siendo la lengua el proprio instrumento
del gusto; y para que padiessemos hablar; y pronunciar bient a venera acada ant y es sen a sol sama lo

huesse chejas, parapoder por ellas oyr, hallanse dos huesse cillos dentro de la cavidad, ò meato auditonio, el vno como ynnque, y otro como martillo, los quales vajando del cerebro, la facultad del oyr les haze algun tanto mover, y miediante yn ayrecillo alli contenido, y la facultad se oye: segun Calvo lib.

Lude Anorhomia capuzoni el suppose, sallat sinasse

carrilagos: están unidas mediantes los museulos inate los los estas estas en los en los estas en

no coningential for the second colors and CVERO; allifond to second colors and COSTILLAS, allowed as a COSTILLAS, allowed as a COSTILLAS, allowed as a COSTALES, and a CLAVICVIAS, and a costales, and

57.5

RUNALL COMPANIES of Commediate And Rundices

Los

Los Musculos intercostales están entre las costillas; sixuen para el movimiento de la respiración dilatandose, y comprimiendose ayudando à ella, son treinta y quatro en cadalado, entre las costillas verdaderas ay seis espacios à quatro musculos, cada vno tiene dos, que son los treinta y quatro, vnos están por la parte de asuera, otros por la de adentro, mediantes los quales, y sus sibras transversales, que suben, y baxan haziendo à modo de vna X. se vnen vnas costillas co otras entre si, que para esto las crió naturaleza segun Calvo lib. de Anothomia cap. 44.

deras, sieste de cada lado, y dies falsas: llamanse verdadaderas, porque se juntamen el huesso sternon; llamanse falsas, porque se ingieren por medio de vnos cartilagos: estàn vnidas mediantes los musculos intercostales, sirven de guarda, y custodia del coraçon, hechas en forma de arco para que huviesse capasidad donde dilatarse, y comprimirse el pulmon, segun Calvo en el tratado de los huessos.

Los espondiles son treinta, y quatro, siete en el cuello, doze en el pecho, seis en los lomos, cinco en el huesso sacro, y quatro en la colilla: sirven de tener el cuerpo derecho, y de moverse hazia arriba, y abajo, vnense por medio de ligamentos, son recios, y duros: tienen algunas humedades, entre si para que no se sequen con el calor del continuo movimiento: tiene cada vno vnorificio à cada lado por donde sa

len los treinta pares de nérvios de la nuca, para el movimiento, porque los de la colilla no tienen esticios, y son más blandos, segun Andres de Leon lib. de Anothomia O ANTINE ANTINE ANTINE DE MANTINE.

Los omoplatos son excabados por dentro, y hibados por suera, algo gruessos por auriba, y delgados por abaxo, están contiguos á las costillas, sirven de escudos à la parte posterior, y de formar la espalda, y de dar lugar à qualquiera movimiento, segun Andres de Leon, y Calvo en sus Anothomias.

El huesso sternon està en la parte delantera enmedio del pecho; dizen, que es compuesto de quatro, ó seis huessos, en su fin se halla voa tunica ternilla, que es la paletilla, todo parece vno, sirve de guarda, y desensa del coraçon, y pulmones segun Calvo.

Las claviculas, o furvelas se articulan mediante yn ligamento en el huesso del pecho, y en esta parte son redondas, y gruessas: sirven de ajuntar el huesso de la espalda, con el pecho, y para que se pueda alzar hazia arriba el braço, y que no se cayesse: segun Calvo libar de Anothomia cap. 33.

La pleura es vna tela delgada, y nerviola, que cubre, y rodea las costillas por dentro: toma principio de los espondiles del pecho, sirve de dar vna tunica à cada vna de las partes contenidas del, senece en el huesso sternon, y sirve de dividir la parte diestra de la siniestra, segun Calvo traido de Galeno, y todos los Authores.

rand Las partes contenidas fon diez. viert sol mel PERICARDIO, AS ARTERIA MAGNA,
CORASONADA DE VENA CABADA (2010) PVLMON. S VENA OSIGOSOGA ob TRACHIARTERIA MEDIASTINOS, OJ ESOPHAGO, 100 20 DIAPHRAGMA, 20 bad El pericardio es vna tela delgada, que cubre; rodea el coraçon, sirve de templarle con valaquosi dad que tiene denero, toma la principio de la tuni ca, que eubre los vasos del coragon, tiene trabaçon con los pulmones, con el coraçon, con el medialtino, y con la parte membranosa del diafragma; tiene cinco orificios, el primero por donde entra la vena cava, el segundo por donde sale para subir à las pares de afriba, el rercero por donde fale la vena arte rial, el quarto por donde entra la vena arterial, el quinto por donde sale la arteria magna, segun Cals Vocapitulo 20. de Anorhomia. any conhaces rest

El coraçon es miembro principal fuente del calor patural, da calor, y vida a todas las particulas del cuerpo mediantes los espiritus vitales, que del se distribuyen cituado en medio del pecho, de substancia de carne dura, y lacertosa entretexida de muchos silamentos, como nerviecillos, de complexion caliente, y seca, tiene dos ventriculos, vno diestro, y otro siniestro, el diestro sirve de recevir, y tener depostada la sangre, que viene del higado por la vena cava, el siniestro sirve de apurar, y afinar la sangre

69.

haziendo della mediante el ayre, que entra por la arteria venal, spirirus vitales, y langre arterial: pafa la fangre de vn ventriculo à otro por vnos poros, tieneel coraçon quatro orificios, o ahugeros dos al la do diestro, y dos àl siniestro, los del lado diestro, el de abajo es por donde entra la vena cava, el otro es el de la vena arterial llamada affi, por que tiene dos tunicas como arteria, y sangre como vena, aunque mas apurada, y con algunos spiritus vitales, y por elso tiene dos runicas por que no se discipe, y resuelva: fenece en el pulmon llevandole sangre mas delicada, y tenue, para su alimento por ser de substancia. delicada: los orros dos orificios del lado finieftro, el vno entra en el, que se llama arteria venal, por que tiene vna tunica como vena para poderse dilatar me for, y comprimir, por la qual entra el ayre preparado por los pulmones en el coraçon, con el qual, y los vapores de la sangre se hazen los spiritus vitales, y sirve de echar alguna porcion de sangre vital al pulmon para nutrir las partes solidas del. El otro es por donde sale la arteria magna aldorso llevando sangre arterial, y spiritus vitales à todas las partes de el cuerpo: tiene dos orejuelas, en cada ventriculo vna de substancia membranosa fria, y seca, tiene a la parte de adentro manifiesta cavidad: sirven para que tuviessen fuertemente los vasos, que entran por alli, y no se rompiessen, y para que recogiessen la substacia que por ellos entra: la derecha es mayor que la DUP if. isquierda à causa que es mucha la sangre venal, que por allientra, y por la artéria venal ayre: hallase à la raiz de la arteria magna vna ternilla pequeña, tiene dos movimientos naturales el coraçon, dilatacion, y compression: con la dilatacion atraé lo que à menester, y con la compression echa de si lo que le dana, ó puede dañar, segun Calvo libro 1. de Anothomia capitulo 20. con autoridad de Galeno, Velasco, y Realdo Columbo.

El Pulmon es de substancia delicada, espongiosa, y rara algo blanquesina, de complexion caliente,
y humeda mediantes los excrementos, que recibe:
sirve para el movimiento de la respiracion, y dilatandose el toraz se dilata, y atrae ayre, y comprimiendose echa el ayre sucra, no tiene movimiento
de su naturaleza, sino mediante el movimiento del
toraz: sirve de ayudar à la voz por que despidiendo
el ayre se forma la voz, segun Calvo capit, 19. traido de Galeno libro 2. del movimiento de los musculos capitulo 6.

La Trachiarteria es vn instrumento por donde pasa el ayre, que respiramos, compuesto de carrilagos à modo de C.C.C. y de partes carnosas: sirve de ensancharse quando se habla recio, y mediante el ayre que por el sale se sona la voz: tiene en la parte alta la nues, ó meringe donde se ingiere murecillos, y senecen los nervios recurrentes, o reversivos, que son el principal instrumento de la voz, segun Galen.

que dize; que si se cortan los de virlado tartamides, y si ambas pierden la voz totalmente: tienen poi la parte interior en su sin la epiglodité que es como cobertera, y quando respiramos se levanta, y quando tragamos se vaja, y tapa la trachiarteria, y destapa el esophago, segun Calvo en sus Anothomias.

El Esophago, ó Gula es compuesto de dos tunicas, la interior nevosa, la exterior algo carnosa vnida a los cartilagos de la trachiarteria, y se dividen estos dos miembros mediante la tela carnosa, sirve de alargarse, estenderse, y encogerse, para que mejor se pueda tragar, à la raiz de la lengua nace aligandos el los espondiles, que convienen al cuello, y pecho, decendiendo, y torciendo el cepto trasverso, y feneciendo en la voca de su estomago, o estomacho, y Guido la llama guturis en su Anothomia.

El Diaphragma, ò cepto transverso es vn musculo ancho, y redondo toma principio del medio desi
mismo, sirve de dividir la cavidad natural de la vital,
tiene movimiento voluntario, aligase à los espondiles de los lomos; por la cavidad vital tiene la tela de
la pleura, y por la natural, de peritoneo: es nervioso,
en su medio tiene gran sentimiento, ramissica el sexto par de nervios, hisolo naturaleza por tres vsos, o
sines, el primero para que sea vna de las partes mas
principales de la respiracion; el segundo para que
ayude à los intestinos à la expulsion de las heces en
la coccion del estomago, y el tercero la division de

las dos cavidades estaramificado de venas nervios. yarterias horadado por tres partes, por la isquierda entra el esophago, por la derecha la vena cava, y por junto al onzeno espondil delpecho la arteria magna, fegun Calvo lib. 1. de Anothomia cap. 171.

La Arteria magna, ò adorso, sale del ventriculo siniestro del coraçon, sirve de llevar spiritus vitales, y sangre arterial à todo el cuerpo, segun Calvo c. 20.

La Vena cava entra en el ventriculo diestro del coraçon horada el diaphragma por el lado derecho, y antes de entrar en el coraçon, lube, y horada el pericardio, y se divide en dos ramos, que son las venas yugulares, sirve de ramificar la cabeça, y cavidad vital, y de llevar sangre al coraçon haziendo como corona: y los Anothomicos las llaman venas coronales, segun Calvo cap. 20.

La Vena osigos, ó sincompañía es vn ramo que và por debaxo del coraçon de la vena cava, sube por los espondiles pasa al lado finiestro, y va subiendo por junto à ellos echando vn ramo por entre cada costilla, y de alli sube por ensima de los espondiles los ramos de las venas para ramificar lascostillas del lado derecho, fegun Fragoso en lu Anothomianico

El Mediastino, o mediastinos son cavos, y remate de la plura, y fenecen en el huesso esternon, sirven de dividir la parte isquierda de la derecha, por que la enfermedad no pase de un lado à otro, y para que tuviesse el coracon en alto, y no cayese sobre los pul-7.08

mones, està ramificado de venas, netvios, marterias, segun Calvo cap. 17. de Anothomia: 6 propins

El vientre tiene partes continentes, y contenidas;

las continentes fon diezothurze al a concerned la

muiara CUERO, ordil on COSTILLAS FALSAS, GORDVRA, S ESPONDILES, 1920 TELA CARNOSA, HUESSOSACRO, ABDOMEN, 2015 PECTEN, 2017 1930

-Hiro PERITONEO, OS LOSILEONES bush

El vientre es dividido en tres partes ; en los ypocondrios, la region del ombligo, y las partes de las vehigas, segun Galeno lib. de los Aphorismos c. 35.

El Cuero, la Gordura, y la Carnofa estan ya dichas el Abdomen es miembro compuesto de ocho musculos, à quatro murecillos quatro de cada parte dos obliquos que descienden, y toman principio de la quinta, fexta, y septima costilla verdaderas; vno de cada lado vajan hasta la mitad del vientre convirtiendose en vna tela nerviosa, que se ingiere en el huesso sacro, sieven de corroborar y fortificar el vientre, segun Guido cap. 6. de Anothomias la rent

Otros dos atcendentes obliquos en las costillas mendosas à modo de Y griega, sirven al movimiento del peritoneo, legun Galeno libero del vior de las to por medio de van terrillo, que to 16 161 equo catter,

Otros dos rectos, o derechos, que nacen del huesso del empeine, fenecen à los lados de la paletilla, shrve de arraer segun Gal·lib de muscul de iech certs.

Los

El Peritoneo, ó syphah es vna tela delgada, y recia, sirve de rodear las partes contenidas del vientre
dando vna tunica à cada vna dellas, tiene dos orisicios por donde pasan los vasos seminales à los testiculos, y los dindimos, ó ligamentos de ellos, segun

Galenoliber. de sem. so. d nous dange, sy nov

De las costillas falsas ya se ha dicho: los Espondiles, que convienen à los lomos sons seis, como tambien se ha dicho; sirven para defensa de las partes de adentro, segun Calvo cap. 28. de Anothomia: y por la parte delantera estàn todos en un ligamento recio, y suerre, secur los besses a allestama a constanta de la las allestas.

fe con el postrer espondil, ó vertebra de los somos, juntase con los ileones donde se encaxa el huesso se mur, segun Daza en el capitulo de la ceatica; y en la parte delántera està el pecten jú os pubes, no tan grue so como los ileones, ó coxendices, o delacia està junto por medio de vna ternilla, que se vee en los niños, pero en las personas de edad se haze de tal manera, que no se vee, hazen estos huessos tres provechos, ò sirven de tres cosas, lo primero para que en ellos se

que

articulase el huesso del muslo, lo segundo para que sustentassen las partes naturales, lo tercero parà que de sus processos saliesen muchos musculos y movies sen el mullo, ò pierna, segun Calvo c. 36, de Anoth.

Las partes contenidas del vientre son ocho. 20 REDATO, no co S. VENA CAVA oh anoli ob ENTRSIJO, O COS ARTERIA MAGNAS MECENTEREO, S VENAPORTA, 19118
INTESTINOS, S PANCREAS, ESTOMAGO, S VRETERAS, VASO, VASO, VASOS SEMINALES,

HIGADO, of many & EMUNGTORIOS, and RITONES, ST. STESTICYLOS, Se Short

VEHIGA DE HIEL, MADRE en las MVGERES. VEHIGADE LA SVENASEMVLGENTES. ORINA, SVENAS MEZARAICAS.

E L Redano es compuesto de dos tunicas delga-das con muchas venecillas, arterias, y nervesuelos a modo de saco, toma principio de la tunica del peritoneo. que cubre el estomago, y della cubre la arteria magna, y vena cava, devaxo del estomago, tiene en su fin mucha gordura à modo de glandulas, llega hasta vn poco mas abajo del ombligo, por que sillega à las roturas algunas vezes dize Calvo que por relaxacion, sirve de tres cosas, ò sines, lo primero por que esten azidos todos los ramos de la vena porta, lo segundo por que atase al estomago en la par te vaja el higado, y intestino colon, lo tercero para

que abrigue los intestinos, y el estomago, y con su gordura le ayude à su coccion por ser partes spermai ricas, y tener poco caldry legua Calvo libro de Anofener mallo, ò pierna, segua Ca dolmigabalmont,

Sup

El Entresijo, ò mesenterio, es vna tela gruessa, y llena de gordura entretexido de venas, que son las mezaraicas chupadoras del chylo, de nervios, y de arterias de langresillas, o mollejuelas, que son las pancreas, que estan entre el estomago, y el higado mas que en otra parte, las quales sirven con su blandura, y suavidad, que no corran detrimento las venas, y vasos, que tiene en los grandes movientos, sirve de atar, y aligar los intestinos, fortifica, sustenta, y fortalezelas venas mezaraicas, nace del peritoneo junto à la medulla spinal, y no es otra cola, que vna reduplicacion del peritoneo, segun Calvo libro de -Anothomia capit. 9. white grand content of 2

El Higado es miembro principal de substancia de carne a manera, y semejanza de sangre elada, de complexion caliente, y humeda, primer instrumento en que se haze la sangre, principio de la virtud natural, y de todas las venas, compuesto de muchos caños, ò ramos de venas, y de arterias, tiene en la tunica adquirida del peritoneo dos nervesuelos, ú otrapaniculo, tela propria, tiene su figura giba por arriba, y caba por abajo, le aliga al septo transverso sube hasta la mirad del estomago para calentarlo, es donde se haze la segunda coccion, sirve de convertir

cie-

del higado accion propria suya, que orra parte del cuerpo no la puede hazer, por la parte alta gibanace la vena cava, y de la caba la porta, segun Calvo libro 1. de Anothomia cap. 11. traido de Ga-

leno lib. 4. de vsu partium cap. 10.

La Vehiga de la hiel es compuesta de dos tunicas vas propria, y otra adquitida del peritoneo en forma de pera, la tunica propria es la interior delgada, con todos tres generos de filos, para atracr, retener, y expeler, sirve de limpiar la sangre atravendo assi la colera por vua parte, y por otra enviando alguna porcion al sin del intestino duodeno, y al estomago para limpiar la slema, que vaja del, ayuda á purgar el vientre, y sa que va al estomago sirve de ca lentar-lo, y secarlo dando el apetito de beber, segun Andres de Leon, y Calvo cap. 11.

El Estemago es vn receptaculo comun de la comida, y bebida donde se cuesce, y convierte en substancia chylosa, es compuesto de dos tunicas, la interior gruessa, y nerviosa, y membranosa, para que pu diesse dilatarse quando sueran muchos los manjares, y la exterior es mas carnosa, tiene vna voca por donde entra el alimento llamada estomago, ó stomachus vn poco hazia la parte izquierda, y otro hazia el lado diestro, y baja llamada janitor, ó pyloron, que es salida principio de los intestinos, sirve de convertir en substancia chylosa el alimento, co-

ciendolo, en la tela nerviosa se envuelben los nervios de la sexta conjuncion por cuya causa es ta sensible: entre estas dos telas se ramissican venas, y arterias para concervacion del calor natural, llegan aun lado de la voca del estomago dos venas, que vienen del vasso con humor ascido, y por ser el de substancia spermatica le ayudan todas las partes vezinas, como el higado, vasso, y redaño, el humor ascido que vaja à la tela interior sirve para coarrugarla, y dar la apetencia de comer, segun Fragoso, y Calvo en el capitulo 8. de su Anothomia, dize: que suera destas dos tuninas tiene otra adquirida del peritoneo, mantienese del chylo, que engendra.

El Vasso es compuesto de vna substancia rara, y porosa de poco sentimiento, receptaculo del higado sirve de arraer assi por vna vena que le viene del higado la sangre mas gruessa, y humor melancholico cociendola, y manteniendose de lo mas subril della, y la que le sobra echa por las dos venas, que van à la voca del estomago coa el humor ascido, para coarrugarlo, y dar la apetencia del comer, tiene vna tela adquirida del peritoneo en la qualse implanta vn ner vesuelo muy delgado por cuya causa, y por ser receptaculo del higado es de poco sentimiento, segun Fragoso, y Calvo en el libro de su Anothomia.

Interior nerviosa, la segunda propria, y la exterior adquirida del peritoneo, en los tenues mas delga-

74

dos, y en los crassos mas gruessos, que nace, y se forma del mecentereo, empiezan del estomago, y son seis, y casi de su misma substancia: senecen en el mus culo, sinter, que es el que sirve de cerrar, y abrir el caño.

El primero se llama duo deno por que es de doze dedos, tiene venas, nervios, y arterias, al fin del qual esta vn orificio por donde entra la colera, que viene

de la vexiga de la hiel.

El segundo yeyuno, por que siempre esta vacio, y se detiene poco el chylo en el por la colera, que enel, es acre, y mordaz, y assi es causa de que el chylo, y las heces no se detengan, y por que le vienen muchas venas mezaraicas, que toman luego el chylo, y
lo llevan al higado.

El tercero es el Ileon, llamase assi por que en el se haze el dolor, yliacho, sirve de detener algo las heces por muchos rodeos, y anfractos que tiene; hallase en la tunica interior vna como mocosidad para que sin dañarles pasen mas bien las heces: en este sene-

cen los tenues.

El quarto se llama ciego por que no tiene mas, que vna voca es el primero de los crassos, y vna anididura de tripa con la boca pequeña, sirve de tener depositado algun chylo, deteniendose alli para si lo huviesse menester el higado lo chupassen las venas mezaraicas, y se lo enviassen. Galeno dize que las aves que excrementan mucho, como

gallinas, y palomas, tienen dos intestinos ciegos.

El colon, ò tripa gorda empieza desde el riñon de recho, va por debajo del higado, sube por ensima del estomago, y senece junto al riñon izquierdo haziendo como cola de Leon, por lo qual, y por hazerse en el el dolor colico se llama colon, sirve de detener mas las heces à causa de tener mas filos transversos,

tiene como gordora en la parte interior.

El sexto es el recto, que empieza junto al huesso sacro, donde senece el colon, tiene filos longitudinales para la expulsion, y transversales para la retencion, tiene en su fin tres musculos el vno redondo en
la extremidad llamado ssinter, que sirve de abrir, y
cerrar, otros dos son anchos, que tienen su nacimieto del huesso sacro, sirven para subir arriba el intescion tecto, son todos de staca complexion mantienense del chylo, son instrumentos tambien de la coccion de las heces: los tenues, distribuyen el chylo,
plos crassos no tanto, por que mas son receptaculo
de las seces, segun Calvo en el capitulo o de su
Anothomia.

be à la cavidad vital, chomo và por junto à los espondiles hazia la parte inférior donde se reparten dos ra mos, que son la venas emulgentes, que sirven de atracie e sucro de la sangre, y trayendo alguna porcio de sangre limpiando el higado entran en los riñones e sucre alguna porcion de humor colerico, à super su la caracteristica de su la super-

stidad de que toma color la orina, que se cuela, y

aparta de la sangre.

Los rinones son compuestos de vna carne dura, y secia redondos hazia los espondiles tiene cada vno dos cenos, ó ventriculos vna tunica suya, y otra del peritoneo, son de sentido pesado, tienen venas, y arterias grandes por las quales no solo les viene sangre para su mantenimiento, sino porsson del humor colerico, de donde toma color la orina, sa qual se va colando por vnos ahugeros al ceno, o cavidad membranosa, que en ellos se halla, y de alla à las vreteras, que vajan à la orina, segun Calvo capitulo 12. de su Anothomia.

Anothomia.

Las vreteras, o conductos de la orina son delicadas, y nerviosas, nacen de los riñones cada vna por su lado hasta la vehiga, entran en ella con cierto anfracto, y rodeo para que en colando no pudiessen otra vez volver atras, sirven de llevar la orina à la vehiga, entra por colacion en ella, y no por resudacion, son solo de vna membrana blanca, y dura, y delicados por ser hechos de nervios los quales ni son venas, ni arterias, ni nervios, sino partes distinctas de las demas, segun Calvo cap. 13, de su Anothomia.

La vehiga de la orina es compuelta de dos tunicas proprias, y otra del peritoneo, y de substancia membranosa, gruessa, y algo dura porque se pudiera dilatar, y porque con la mordacidad de la orina sacilmente no se vicerasse, participa de todos tres ge-

Rivo de Velatco.

neros de filos para atraer, retener, y expeler, esta situada debaxo del huesso pecten, y sobre el intestino
recto tiene cavidad, y cuello en los hombres algo ob
liquo, y en las mugeres recto, tiene vn musculo en el
cuello sinter porque sirve de abrir, y cerrar, tiene en el dos mollejuelas, que provocan al apetito causandole deleyte, sirven para que el humor,
que tienen como aseyte humedesca el caño, y el mus
culo sirve de tres cosas, para que no se quede nada
en la via, para que no salga sin otro consentimiento,
y para apresurar lo que saliere, tiene venas de la cava, arterias de la arteria magna, nervios de la sexta
conjugacion, segun Calvo en el capitulo 13. de su
Anothomia.

La arteria magna nace del coraçon horada el diaphragma por junto à los espondiles, sirve antes que vaje à la cavidad natural, ramissica todas las partesssuperiores, ramissicando la nucha entre las costillas por la parte posterior del pecho, ramissica la cabeça, ramissica el diaphragma, dividida en dos ramos, con vno ramissica la parte diestra, y con otro la siniestra del diaphragma, y se juntan en el orissico de el, vajando desde alli produce dos ramos, que van con los emulgentes ramissicando los intestinos, ata las arterias emorroidales, y mas abajoproduce otras de que se hazen los vassos seminales, y de alli ramissican las piernas, vehiga, y testiculos, segun Fragoso traido de Velasco.

Los vassos seminales son compuestos de dos venas, que la vna nace de la cava, que es la derecha, y la otra de la emulgente, que es la izquierda, juntanse con dos arterias, que nacen de la arteria magna a modo de tixeretas, y desde alli se llaman preparantes, sirven de preparar vniendose la sangre venal con la arterial, de hazer el semen dandole algun color blanco, hasta que llegan à la substancia de los testiculos, que por ser de substancia blanca toman el color, y por tener facultad generativa, segun Galeno libro de semine.

Los testiculos son miembros principales para la generacion, de complexion caliente, conservan el calor natural tienen calor como el coraçon, dan su er za al individuo, conservan la specie, dan vtilidad al hombre, y suerza à todos los miembros del cuerpo, son conpuestos de substancia blanca, algo blanda, tienen dos tunicas, la interior propria, y la otra adquirida del peritoneo, tiene venas, y arterias de los vassos seminales, y nervios del sexto par, tiene otras dos tunicas, que forman el escroto, o bolsas la primera del cutis verdadero, y la segunda de la tela car nosa, que alli no ay gordura, y esta està siempre coar rugada, segun Calvo cap. 14. de Anothomia.

La madre en las mugeres, ò vtero es de substancia membranosa para que pudiesse dilatarse, esta membrana es dura, y gruessa tiene dos tunicas vna propria, y otra adquirida del peritoneo, tiene silos, ò

hebras derechas con que atrae el semen, otras obliquas para detenerle, y a la criatura, otras transversas para ayudar à hechar la criatura, elta lituada entre el intestino, y la vehiga de la orina, tiene figura redonda, es liza por la parte de fuera por que no se pegase a ninguna parte quando se ensancha, tiene dos tunicas, o membranas para que serrassen la boca de/ afuera de la madre para defensa del ayre, frio, calor, o polvo, en su cuello tiene los restes, y vienen à ellos los vassos seminales, y en lo alto de la boca de afuera de la madre se hallan dos mollejuelas, que sirven para la delectación llamadas nimpheas, y debajo fe hala el orificio del caño de la orina, segun Fragoso, y Velascotiene arterias, venas, y nervios del sexto par que viene del cerebro, tiene el vtero muchos ahujeros, que llaman cenos, y no son sino vocas de venas por donde viene la sangre, que se evacua cada mes, fegun Calvo, en el qual se podran ver todas las particularidades de la madre, que son muchas, hallaraseen la Anothomia cap. 16.

La vena porta nace de la parte concaba del higado, y esta se reparte en muchos ramos dos pequenos que van à la vehiga de la hiel, otro al fondo del
est omago, otro al intestino duodeno, y alla para, y se
divide en dos, de los quales algunos va à laspancreas,
otros à las tunicas del redaño, y otros ramos van al
entresijo, o mecenterio, è intestinos, de los quales se
hazen las mezaraicas, despues desta distribucion sir

77.

ve para atradradi como con las mándo eb chylordes los mes primetos intestinos abinigado legani Calvo, l dapar 4 a de Anothomia de las venas libre il beanium

Los emunicionios son unas glandulas, o landresillasde, una carne osponejota tara jo algo gruesta; que apretando las contos dedos se desazen; son huntedas obiscosas, trattante denas de las opejas, deba xo de losbraços y en las ingles, diengendranse de sas lutha medades, sirven debrecebirto que come biscoso dev las cavidades, mantienense de sas mismas huntedas des, acuya causa ensima deblas sienbrie av pelos; sep gun Daza traido de Hyppoct tibo de Glandulis o no mantienense, y esemalo, sosse a contra contra

cade in consideration of the constant of the c

Uesso es mitbro duro simple sper natico de comple xion fria, sota, y terrestre, que se mantiene del binnor melancolito: y tiene el cuerpo (si los examino) dozientos, y veinte y nueve cabenle à la cabeça, y rostro quarenta y dos, ocho en la cabeça, el coronas, el occipital, dos petrosos, dos parietales, el bacilar, y el criboso, en el rostro dos mandibulas, ò quixadas, ocho dientes, quatro colmillos, veinte muelas, cabenle al pescuelo siete espondiles, al pecho, y espalda les caben quaienta y vno, el huesso sterior dos claviculas, dos omoplatos, doze espondiles, y vein-

T

te, y quatro costillas, catorze verdaderas fiete cada lado, y diez fallas: al vientre le caben diez y nueve. quinze espondiles, seis en los lomos, y cinco en el huesso sacro, y quatro en la colilla, dos ileones, el ofpubis, ó pecten, y el huesso sacro, à los braços, manos, y dedos, fessenta treinta en cada lado, el de arriba es el mayor, que se vne con el hombrollamador adlutorio, dos del codo à la muneca, el de adentrol vina, el de afuera radio, ocho en la muñeca, quatro en cadapalma de la mano, rres en cada dedo, que son quinze en los dedos de la mano, que son treinta, otros tantos en el otro braço, muñeca, palma, y dedos: à los muslos, piernas, y pies sessenta treinta en cada vno, el mayor, que es llamado femur es el de muslo, ensima de la rodilla, rotula, o choquesuela, dos de la rodilla, al tovillo, la de adentro tibia, la de afuera sura vn carcaneo en cada pie, seis en cada talon, cinco en cada planta, catorze en los dedos de cada pie por que el dedo gordo tiene dos, que son treinta en cada pietna, muslo, pie, y dedos, con que enambos son sessenza, segun Andres de Leon en el tratado de Anoth, y segun Tamayo en so Algebra.

elecantal, a COODINIFIC es, ella ar, or of an all of all

Lamusculaies miembro compuesto, que bermosea, acompaña mueve y hinche las partes del cuerpo, co cla-

claro, y aparente movimieeto voluntario hecho de car ne hilachosa de que toma su grandeza, y movimiento de venas, para mantenerce, de arterias, para vivisicarse, de nervios, para sentimiento, de telas para divission de vnos, y otros, y de ligamentos, y cuerdas para su travazon, y són trescientos, y treinta y nuebe segun Guido en la tabla de la numeracian de los

musculos segun Avicena.

Cabenle à la cabeça, y rostro setenta y vno, seis pares à la parte posterior de la cabeça, que se terminàn en los huessos de la posterior parte della, y nace otro par, que se ingiere en el huesto arriba de las orejas, que son los temporales à cada cien dos, à la frente quatro, à cada seja dos, á cada ojo siete, à la naris quatro, á los labios quatro, á la lengua nuebe, à cada mexilla tres, y à cada quixada quatro, à la gargãta, y cuello treinta, à la nues vno, al pecho, y diaphragma ochenta y dos, y al diaphragma vno, sesenta y ocho à los musculos intercostales quatro, y dos en la espalda, y los demas al pecho, y al vientre ocho, al intestino recto tres, al cuello de la vehiga vno, al viril quatro, à cada braço, muñeca, y dedos quarenta y nuebe, del hombro al codo siete, del codo à la muñeca quatro, à la mano, y muñeca diez y siete, à los dedos veinte y vno, à cada testiculo vno, y tres al peritoneo, à cada musso diez, à cada pie, y pierna doze, à los dedos de cada pie nuebe, que son en ambos sessenta y dos, segun Guido, que los trae de Avicena en el libro de la numeración de los mulculos; otros traen mas, y otros menos, pero Guido los trae en su Anothomia, que son trescientos de sing salos y setenta y nuebe, donde se de la libra de la libr

tension legion Aritonal

Cabenies la cabeça, y roftro setenta y vno, seis parec à la parte polibrior de la cabeça, que se terminan en los huessos de la posterior parte della, y race orro par, que le ingiere en el huello arriba de las orejes que fra los temporales à codrecien dus à la fichrequirer, i radatoja dos, a cada ojo fiere. E la maris quatro, à los labios quatro, à la lengua nuenz, à cada mexilla tres, y à cada quixada quatro, à la gargãen, veuello recinca, à la nues vno, al pecho, y diaphragma ochenta y dos, y al diaphragma vno, fe. lenta y ocho à los mulculos intercoltales odatro, y dos en la espalda, y los demás alpecho, y al vientre ocho, al intellino recho tres, al cuello de la vehiga vno, al viril quaero, à cada braço, muneca, y dedos quarenta y nuche, del hombro al codo fiere, del codo à la mefieca que tre, à la mano, y muntea diez y Seed, Mosdalos velnus pracelicada telficale grang v tres al peritonee, à cada mes lo diez, à cada pie, v pierna doze, a los declos de cada pie nuebe, que lon sallenta y dos, segun Guido, que los trac 25



venit per u oleske R'A B L venit per u se de leve-ait, cenultaris graves est, qam, Errenteriones, qua ad

IT A brevis, ars longa, accasio praceps, experimentum periculosum, iudicium districise? nec'solum se ipsum præstare opportet oportuna sacientem, sed &

zgrorum, & affiltentes, & exteriora, no sinci maito

- 2. In perturbationibus ventris, & vomitibus fpon tinis, sitalia purgentur, qualra purgari opporter confert, & leviter ferunt, fin minus contra: sic, & vassorum inanitio, stalis fiat, qualis fiel'i dever confert, &bene tollerant, sin minus contra: inspicere itaque opportet, & regionem, & tempus, & atatem, & morbes in quibus conveniar, and charity of spring ni sod

-3 Habitus exercitatorum, qui ad summum bonisatisattingunt periculofi, frin extremo constiterint, neque enim possunt in codem statu permanere, neque quiescere: cum vero non quiescant, neque pos-

sunt proficere in melius. Reliquum est igitur, vt decidant in deterius, his de causis bonum habitum statim solvere expedit, vt corpus rursus nutriri incipiat. neque compressiones ad extremum ducenda; periculosum enim, sed qualis natura fuerit eius qui debet perferre ad hoc ducere convenit. Sic & evacuationes quæ ad extremum deducunt periculosæ, & rursus refectiones cum extremæ fuerint periculosæ.

4. Victus tenuis, atque exquisitus in morbis quidem longis semper; in acutis vero in quibus non covenit periculosus, & rursus, qui ad extremum devenit, tenuitatis gravis est, nam, & repletiones, quæ ad

extremum deveniunt graves sunt.

5. In tenui victu zgri delinquentes magis læduntur, quicumque enim error commititur maior in hoc fit, quam in paulo pleniori victu, propterea etiam sanis periculosus existit valde tenuis constitue tus, & exquisitus victus, quoniam errores gravius ferunt ob hoc igitur tenuis victus, atque admodum ex quisitus eo qui sit paulo plenior ma gis periculosus.

6. Extremis morbis extrema & exquisita remedia

optima sunt. The interest of the control of the optima sunt of the opt bes labores, & extreme tenuissimo victu vtendum est: vbi vero non, sed pleniorem victum contigit adhibere tantum sibi indulgendum est, quam morbus extremisest mollior por les de mus espesa

8. Quando morbus in suo vigere constiterit, tunc Sandalis

victu tenuissimo vienduia est, a targe unite orainule 29. Coniectariautem opportetan æger cum victu fufficiar perdurare donec morbus consistar, & numquid prius ille deficiat, nec possit cum victu perdurase, vel morbus antea deficiar, atque hebetescat.

Jio. Quibus igitur statim morbus consistit, ijs statim renuis victus adhibendus est: quibus vero posterius devet confistere; is, & in ipso consistendi rempore, & parumante illud cibus subtrahendus: prius vero vberius agendum, vt æger sufficiat.

PIT. In accessionibus abstinere opportet, nam cibum dare nocum est, & quibus per circuitum fiunt accessiones, in ipsa accessione abstinere opportet.

12. Accessiones vero, & constitutiones morbi indicabunt, & anni tempora, & circuituum successiva incrementa, five quotidie, sive alternis diebus, sive per maiora intervalla fiant, sed ex ijs, que mox apparent indicia summuntur, quemadum in morbo laterali; sicirca initia statim sputum appareat morbum breviat: si vero postea appareat producit, & vri nz, & alviexcrementa, & sudores; quacumque apparuerint, vel bonam morborum indicationem, vel malam, vel breves, aut longos fore morbos oftendut.

13. Senes facillime ieiunium ferunt, secundoloco, qui ætatem consissentem habent, minus adolescentes omnium minime pueri, præseitim qui inter ip-

24. Qui crescunt plurimum habent calidi innati DEDIN

plurimo igitur egent alimento, alioquin corpusable mitur: senibus vero param calidi innatiin est paugis propterea fomitibus egent quia amultis extinguntura hac etiam ob caulam febres senibus no similicer acu tæ fiunt, frigidum enim corpus, som lev, sura-15. Ventres hyeme, & verenatura calidifimilut, & lomni longissimi, quare per ea tempora alimenta

copioliora funt exhibenda, etenim tunc calor innatus plurimus oft, vnde, & pluribus egent alimentis; indicio funt atates, & athleta, mibnes a arredy orev

16. Victus humidus febricirantibus omnibus con ferest, maxime vero pueris, & alijs qui tali victu vti

asceffiones, in ipla acceffione abiline interpolition level. Et qui per lemel, sudjup 20, si daus, lemel sudjup 17. L. pauciora particulatim opporteat afferre concideran dum:condonandum autem aliquid rempori, etati, & consuctudini. ve permaiora intervalla fiant. El ex

18. Æstate, & autumno cibos difficilime ferunt, hyeme facilime: fecundum locum verhabet: arousi

19. His qui per circuitus accessiones habent nihil dare opportet, neque cogere, sed subtrahere adieca paruerint, vel bonam morborem idalearionem

20. Que iudicantur, & iudicața sunt integre, neque movere, neque novare aliquid sibi medicamentis, hye aliter irritando, sed sinere opposter and imp

21, Que ducere opportet, quò maxime natura vergit per loca conferentia, eo ducere conveniti con

22. Concocta medicari atque movere non cruda, neque me la

neque in principijs modo non turgeant: plurima ve-

ro non turgent.

23. Deiectiones non multitudine funt æstimandæ, sad si wha deijciantur, qualia conveniunt, & egri sacile tolerant, atque vbi vsque ad animi defectionem expendit ducere saciendam, si æger possit tolerare.

24. In acutis passionibus raro, & in principijs medicinis purgantibus vti, & hoc cum præmeditatione

faciendum.

25. Si qualia opportet purgari purgentur, confert, & facile ferunt, si contra difficulter.

LIBER II.

1. IN quo morbo somnus laborem facit, mortale: fi vero iubat non mortale.

2. Vbi somnus delirium sedat bonum.

- 3. Somnus, arque vigilia vtraque simodum excelserint malum.
- 4. Non satietas, non sames, neque aliud quidquam quod modum naturæ excesserit bonum.

5. Spontaneæ lassitudines morbos prænuntiant.

6. Quicumque dolentes parte aliqua corporis om nino dolorem non sentiunt, ijs mens ægrotat.

7. Quæ longo tempore extenuantur corpora len-

te reficere opportet, quæ vero brevi, breviter.

8. Si quis à morbo cibum assumens non corroboratur, pluri alimento corpus vti significatur, quod si V non assumente cibum hoc accidat scire opportet, quod indiget evacuatione.

9. Corpora quocumque quispiam purgare volue-

rit opporter fluida facere.

nagis lædes.

11. Facilius est impleri potu, quam cibis.

12. Quæ relinquuntur in morbis post iuditium re-

13. Quibuscumque crisis, idest, iudicatio sit, ijs nox gravis ante accessionem, quæ vero subsequitur magna ex parte levior existit.

14. In profluvijs alvi mutationes excrementorum

iubant, nisi ad mala mutatio fiat.

15. Vbi fauces ægrotant, aut tubercula nascuntur in corpore, excrementiones inspicere opportet, nam sibiliosæ suerint corpus vna ægrotat, si vero similes sanis tutum est corpus nutrire.

16. Vbifames, laborandum nonest.

17. Vbi cibus preternaturam plus ingestus est, hic morbum facit, ostendit autem fanatio.

18. Eorum, quæ acervatim, & velociter nutriunt,

veloces quoque fiunt excretiones.

19. Acutorum morborum non omnino funt fertx

præmuntiationes, aut saluris, aut mortis.

20. Quibus iuvenibus adhuc alvus humecta est, ijs senescentibus exsicatur: quibus vero iuvenibus, adhuc alvus sica est, ijs senescentibus humectatur.

22.Fa-

22. Famem thorexis, idest, vini potio, solvit.

22. Quicumque morbi ex repletione fiunt, curat evacuatio, & quicumque ex evacuatione, repletio, & aliorum contrarietas.

23, Acuti morbi in quatuordecim diebus iudi-

cantur.

24. Septenorum quartus est index, alterius septimanæ octavus principium, est autem, & vndecimus contemplabilis, ipse enim quartus est secundæ septimanæ. rursus vero, & decimus septimus contemplabilis, ipse siquidem quartus est, à quarto decimo, septimus vero ab vndecimo.

25. Æstivæ quartanæ magna ex parte breves, autumnales longæ, & maxime, quæ hyemem attingunt

26. Febrem convulsioni supervenire, melius, qua

febri convulsionem.

27. His qui non ex ratione levius se habent, non opportet fidere, neque multum formidare mala, que præter rationem eveniunt, plurima enim talia stabilia non sunt, neque multum durare, & permanere consuevere.

28 Febricitantium non omnino leviter permanere corpus, & nihil minui, vel etiam plus, quam ratio postulat cotabescere, malum: illud enim morbi longitudinem, hoc vero invecillitatem fignificat.

29. Cum morbi inchoant siquidem movendum videtur move, cum vero consistunt, ac vigent me-

lius est quietem habere.

30. Circa initia, & fines omnia imbecilliora: cum vero consistunt fortiora.

31. Eius, qui exægritudine bene cibatur nihil pro-

* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ficere corpus, malum.

32. Omnes fere qui male se habent circa initia bene cibati, nec quicquam proficientes, circa finem rur sus cibum non appetunt: postea bene aperentes, ij me lius evadunt.

33. In quovis morbo mente constare, & bene se habere ad illa que offeruntur bonum: contra vero se habere malum.

34. In morbis minus periclitantur, quorum natura, & ætati, & habitui, & tempori magit congruit morbus, quam quibus secundum nihil istorum congruit.

35. In quovis morbo partes ad vmbilicum, & immum ventrem attinentes crascitudinem habere melius est, multum vero extenuari, ac contabescere pravum, sed, & hoc quoque ad inferiores purgationes periculosum.

36. Qui salubritatem corporis habent per medicamenta evacuati sito exsolvuntur, & qui pravo vtu-

turcibo.

37. Qui bene se habent corpore difficulter ferunt medicationes.

melioribus quidem, sed minus suavibus est præserendus,

83

39. Seniores iuvenibus plurimum ægrotant minus qui vero morbi ipsis accidunt longi, maxima ex parte commitantur ad mortem.

40. Raucedines, & gravedines in valde senibus

cocctionem non admirunt.

41. Qui frequenter, ac fortiter absque causa manifesta exolvuntur subito mossiuntur.

42. Solvere morbum, quem apoplexiam vocant fortem, impossibile; debilem vero non facile.

43. Strangulati, ac disoluti non dam mortui non

referuntur quibus spuma circa os fuerit.

44. Qui natura admodum crassi sunt, sitius inte-

reunt, quam qui graciles.

45. Quicumque pueri morbo commitiali laborant mutatione maxime atatis, & temporum, & locorum, & victuumquoque genere liberantur.

46. Duobus doloribus simul non eundem locum

infestantibus, vehementior alterum obscurat.

dunt magis, quam iam confecto, itomis land can i

48. In omni corporis motu vbi laborare caperit,

quies statim lassitudine aufert. -

49. Qui consueri sunt solitos labores serre, & si suerint imbecilles, & senes non consueris sortibus, at que invenibus facilius serunt.

50. Quæ ex longo tempore consueta sunt, & si deteriora sunt in suetis minus molestare solent, oppor-

tet igitur ad insueta permutari.

500 51.

51. Plurimum, atque repente evacuare, velreplere vel calefacere, vel refrigerare, sive quovis alio modo corpus movere, periculosum, quoniam omne nimium est, naturæ inimicum; sed quod paulatum fit, tutum est tum: tum alias, tum cum ab altero ad ale rum transitus sit. de per moi de l'establique de la seconda se

fuccedat secundum rationem: non est transcundum ad aliud stante eo, quod à principio visum est.

53. Quicumque alvos humidas habent, siquidem iuvenes fuerint in melius degunt, his qui siccas habent; ad senectam vero deterius degunt; nam senescentibus magna ex parte exficeantur.

54. Magnitudo corporis iuventæ quidem, neque indicens neque illiberalis, senecta vero invtilis, &de-

terior parvitate. THE RILL OF THE STATE OF THE ST

1. M Vtationes temporum potissimum pariunt morbos, & intemporibus magnæ mutationes, aut frigoris, aut caloris, & alia pro ratione codem modo. Total id. 200 men en en en

2. Naturarum hæ: quidem ad æstatem, hæ: vero ad

hyemem bene, male ve se habent.

Morbi quoque alij ad alia bene, vel male se habent, & quædam ætates ad tempora, & loca, & victus genera.

4. In temporibus quando cadem die: modo calor, modo frigus fit: autumnales morbos expectare op-

portet.

84

7. Austri auditum hebetantes, caliginosi caput gravantes, pigri disolventes quando huius cemodi tempestas prævaluerit, talia in morbis patiuntur: it si aquilonia fuerit, tusses, fauces, alviduræ, dificulta tes vrinæ, horrores, cost atum dolores, & pecoris, quando hæctempestas prævaluerit talia in morbis expectare opportet.

6. Quando æstas sit veri similes sudores in febri-

ous multos expectare opporter.

7. In ficcitatibus febres acutæ fiunt, & si annus magna ex parte talis fuerit; qualem fecerit constituionem, tales plurimum morbos c pportet expectare.

8. Inconstantibus temporibus, cum tempestive empestiva redduntur; morbi constantes, & boni udicij siunt: in inconstantibus autem inconstantes, & mali iudici.

9. Autumno morbi acutissimi, at q exitiales maxima x parte, verautemsaluberrimum, & minimeexitiale.

io. Autumnus tabidis malus.

11. De temporibus siquidem hyems sicca, & aqui onia fuerit, ver autem pluviosum, & australe necese est æstate sebres acutas sieri, & lippitudines (græiophthalmias vocant) & dyssenterias, præcipue ero mulieribus, & viris qui natura sunt humidiores 12. Si vero hyems anstralis, & pluviosa, & elemés uerit, ver autem siccum, & aquilonium; musieres quibus partus ad ver in est ex quacumque ocassione bortiunt, quæ vero parient imbecilles, & morbidos

infantes pariunt, quare, vel statim intereunt, vel tenues, & valetudinarij vivunt. Cæteris vero mortalibus disenteriæ, & lippitudines siccce siunt: senioribus autem distilationes, quæsito interiment-

13. Si vero æstas sicca fuerit, & aquilonia, autumnus vero pluviosus, & autralis, dolores capitis ad hyemem siunt, & tusses raucedines; atque gravedi-

nes, quibusdam, autem & tabes.

14. Si vero aquilonius, & siccus, his qui naturam habent humidiorem, & mulieribus conferet, reliquis autem erunt lippitudines siccæ, febres acutæ, & gravedines, non nullis vero, & atræbiles.

15. Exani autem constitutionibus (quod in totum dixerim) siccitates imbribus sunt salubriores,

& minus mortiferæ.

16. Morbi in pluviarum multitudine magna ex parte fiunt, febres longæ, alvi profluvia, putredines, morbi comitiales, aplopexiæ, & anginæ. In ficcita tibus autem tabitudines, lippitudines, articulorum dolores, stillicidia vrinæ, & dificultates intestinorum

quidem corpora denzant, & robusta, & bene movilia coloratiora, & melius audientia faciunt, & alvos exticcant, & oculos mordent, & si pectus dolor aliquis obsederit dolorem augent, austrinæ disolvunt corpora, & humectant auditum obtundunt, capita agravant, & vertigines faciunt, oculis, atque corporibus discilem motum præstant, & alvos humectat.

18.Per

18. Per tempora anni vere quidem, & prima xtate pueri, & qui hos sequuntus xtate, optime degunt, & sani sunt maxime: xstate vero, & autumno vsque ad aliquid senes, reliquum, & hyeme, qui me-

diam ztatem hallent.

19. Morbi omnes quidem in omnibus temporibus fium, quidam vero magis in quibusdam ipsorum

& fiunt, & exacerbantur.

20. Vere etenim furores, & atræbiles, & morbi comitiales, & profluvia fanguinis, & anginæ, & gravedines, & raucedines, & lepræ, & tustes, & impetigines, & vitiligines, & pustulæ vicerosæ plurimæ, & tubercula, & articulorum dolores.

21. Æstate autem non nulli horum, & febres continux, & ardentes, & tertianæ febres plurimæ, & quartanæ, & vomitus, & alvi prosluvia, & lippitudines oculorum, & aurium dolores, & oris viceratio-

nes, & genitalium putredines, & sudamina.

22. Autumno vero, & plurimi æstivi morbi sunt, & febres quartanæ, & erraticæ, & lienes, & aquæ intercutem, & tabes, & stillicidia vrinæ, & dissicultates intestinorum, & coxendicum dolores, & anginę, & anhelationes (quas Greci asthmata vocant) & il ei, & morbi comitiales, & surores, & atræbiles.

13. Hyeme vero morbi laterales, & pulmonis inflammationes, & gravedines, atque raucedines, tusles, dolores pectoris, & laterum, atque lumborum,

capitis dolores, vertigines, & apoplexiæ.

24. In

24. In ætatibus autem talia contingunt parvis, & nuper natis puerulis, fervida oris vlcera (quæ aphthæ vocantur) vomitus, tusses, vigiliæ, pavores, vmbilici inslammationes, aurium humiditates.

25. In progressu verò cum iam dentire incipiunt gingibarum prutigines, sebres, convulsiones, alviprosluvia, & maxime, cum caninos edunt dentes, & ijs præsertim pueris, qui crassssimi sunt, & alvos duras habent.

vetebræ, quæ in occipitio est ad interiora, luxationes, crebi anhelitus, quos Græci asthmata vocant, calculi, lumbrici rotundi, ascarides, verrucæ, quas Græci, acro cordanas vocant, satyriæ, strumæ, & alia tubercula, sed præcipue ante dista.

27. Grandioribus autem, & iam accedentibus ad pubertatem plurima ex his, & febres diutumæ ma-

gis, & ex naribus profluvia sanguinis.

28. Plurimæ autem passiones puerulis iudicantur non nullæ quidem in quadraginta diebus, non nullæ in septem mensibus, non nullæ vero in annis septem, quædam vero iam pubem accedentibus: quæ vero permanserint, nec in pubertate finierint, puerulis, aut fæminis cum menstrua erumpunt consenesce-re consueverunt.

29. Iuvenibus autem languinis spuitiones, tabes, febres acutæ, morbus comitialis, & alij, sed præcipue antedicti.

30. Vltra hac ætatem asthma,idest, creber anhelitus, morbi laterales, pulmonis inflammationes, lethargi, phrenitides, ardores, diuturna profluvia, choleræ, difficultates intestinorum, levitates intes-

tinorum, hæmorrhoydes.

31. Senibus spirandi difficultates, destilationes cum tusti, vrinæ stillicidia, vrinæ dissicultates, articulorum dolores, renum passiones, vertigines, apoplexiæ, mali habitus, pruritus totius corporis, vigiliæ, alvi, oculorum, & narium humiditates, vissus obtussus, raucedines, auditus graves.

LIBER IV.

1. V Tero gerentes sunt medicanda, si materia turget quarto mense, & vsque ad septimum, sed hæminus, iuniora autem, & seniora vereri opportet.

2. In medicationibus talia é ducere é corpore, qualia, & sponte prodeuntia, vtile: quæ vero contra-

rio modo prodeunt cohibere opportet.

3. Si qualia opportet purgari purgentur, confert, & leviter ferunt, contra vero graviter.

4. Medicare æstate superiores magis, hyeme vero

inferiores.

5. Sub cane, & ante canem difficiles sunt medicationes.

6. Graciles, & facile vomentes purgare superius, X2

caventes hyeme.

7. Vomentes vero dificulter, & mediocriter, beine carnosos per inferiora caventes æstatem.

8. Tabidos vero caventes ad superiores purgationes.

9. Melancholicos antem plenius per inferiora eadem ratione contraria opponentes.

10. Medicari in valde acutis si materia turget eà-

dem die, tardare enim in talibus malum est.

11. Quibus sunt tormina, & circa vmbilicum, & lumborum dolor, qui neque à medicamento, neque aliter solvitur in aquam inter cutem siccam firmatur.

12. Quorum alvi intestinorum sevitate laborant,

hyberno tempore supra purgari malum.

13. Ad elleboros, qui non facile suprapurgant ur corum corpora antepotionem pluri cibo, atque quie te humectanda sunt.

14. Cum biberit quis elleborum admotiones quidem corporum ducere magis, ad fomnos vero, atque quietem minus, indicat autem navigatio turbari motione corpus.

15. Cum volueris magis ducere elleborum, move corpus cum vero sistere somnum facito, & non

moveto

16. Carnes sanas habentibus elleborus periculofus, facit enim convulsionem.

17. Si quis febrem non habens abstineat à cibo, &

cor-

cordis morsum seu vertiginem patitur, & oris amaritudinem sentir purgatione indigere per superiora fignification or or more or they to suprementage the in

18. Supra septum transversum dolores qui purgatione indigent, per superiora purgatione indigere significant. Quicumque vero inferiora molestant

19. Qui in medicamentis purgati non sitiunt, non

quisecunt prius quam sitiant.

20. Nonfebricitantibus si tormina acciderint, & genum gravitas, & lumborum dolor; purgari infe-

rius opportere lignificatur. Months into mic

21. Deiectiones nigra (qualis est sanguis niger) sponte venienres, sive cum febre, sive sine febre pefsime, & quanto colores pravi fuerint plures tanto magis malum est, cum medicamento vero, melius, & quanto colores plures fuerint non malum est.

24. Morbis quibus liber incipientibus, si atrabilis,

vel supra, vel infra exierit lethale.

23. Quibuscumque ex morbis acutis, aut diuturnis, vel ex vulneribus, sive quovis alio modo extenuatis nigra vilis, sive vti sanguis niger de subter exierit, postridie moriuntur.

24. Difficultas intestinoru, si ab atrabile inceperit

Jerhalis est: 2 20 a cinque de conscionares

25. Sanguis quidem supra qualiscumque fuerit malus infra autem bonum est nigra deijci.

26. A difficultate intestinorum habito si veluti ma tarcarnuncule exierint lethale est.

27. Quibus in febribus fanguinis fluxerit multitudo quacumque ex parte: cum reficiuntur alviijs humectantur.

28. Quibus biliose deiectiones sunt superveniente surditate cessant: & quibus surditas; supervenientibus biliosis deiectionibus cessar.

29. Quibus in febribus sexto die rigores fiunt dif-

ficile iuditum sequitur.

30. Quibuscumque accessiones siunt quacumque hora febris dimisserit, si eadem cras occupaverit iuditium habent dissicile.

31. Lassitudinem habentibus in febribus: in articulos, & circa maxillas potissimum abcessus fiunt.

32. Quibuscumque resurgentibus ex morbis si

quidlaboraverit, hic fiunt abcessus.

33. Sed & si ante morbum aliqua parte doluerit, hicmorbus sirmatur.

34. Si à febre habito tumore non existente in faucibus strangulatio repente supervenerit, lethale.

35. Si à febre habito collum pervertitur, & vix po-

telt devorare sine vllo tumore lethale est.

36. Sudores febricitanti si inceperint boni, & tertio die, & quinto, & septimo, & nono, & vndecimo,
& quartodecimo, & septimodecimo, & vigecimo
septimo, & trigecimoquarto; hi enim sudores iudicant morbos; qui vero non ita fiunt laborem signisicant, & morbi longitudinem, & recidivam.

37.

37. Frigidi sudores, cum acuta quidem febre mor. tem, cum mitiori autem longitudinem morbi significant.

38. Qua parte corporis sudor est ibi significat

39. Et qua parte corporis calor, aut frigus ibi

40. Et vbi in toto corpore mutationes, & si corpus perfrigeretur, vel rursus calesiat, vel dolor alter ex

altero fiat, longitudinem morbi significat.

41. Sudor multus ex somno factus absque causa manisesta corpus vti pluri cibo significat: Si vero cibu; non accipienti hoc accidat scire opportet, quod evacuatione corpus indiget.

42. Sudor multus calidus, vel fridus semper slues, frigidus magis, calidus minus significat morbum.

- 43. Febres quæcumque non intermittentes, tertia die fortiores fiunt magis periculosæ, quocumque autem modo intermisserint periculum ab esse significatur.
- 44. Quibus febres longæijs tubercula, vel labores in a ticulis fiunt.
- 45. Quibus tubercula, vel in articulis labores fiūt hi pluribus vtuntur cibis.
- 46. Si rigor incidat febre non deficiente ægro iam devili lethale est.
- 47. Excreationes in febribus non intermittentibus, lividz, cruentz, feridz, & biliofz omnes male:

at bene exeunt sive per alvi excret onem, sive per vrinas bonæ: si vero, aliquid eorum quæ iuvant per hæc loca non exernitur malum.

48. In febribus non intermittentibus si partes exteriores frigide, interiores vruntul, & sitim habeant,

Herhaleeft. a grain time in the contra

49. In febre non intermitente, si labrum, vel palpebra, vel supercilium, vel oculus, vel nasus pervertatur, vel non videat, vel non audiat, iam devili ex istente corpore, quicquid horum evenerit mors proxima est.

50. Vbi in febre non intermittente, difficultas spi-

randi, & delirium acciderit lethale.

51. In febribus abcessus qui ad primas iudicationes non solvuntur longitudinem morbi significant.

52. Quicumque in febribus, vel in alijs morbis sponte illacrimant, nihil absurdum, qui vero non sponte absurdius.

33. Quibus circa dentes in febribus quidam len-

tores nascuntur, ijs fortes fiunt sebres.

54. Quibus plurimum ficce tusses leviter irrituntes in sebribus ardentibus fiunt, non multum si

55. Ex glandularum tumoribus febres omnes ma-

lepræter diarias.

55. Febricitanti sudor superveniens febre non de sterente malum, prorogatur enim morbus, & mul sain significat humiditatem.

357. Qui à convulsione, aut distention: nervo

run

rum tenetur febre superveniente, siberatur, poisson

58. A febre ardente habito rigore superveniente, Column partiarbace qualestiaciniverdio

59. Tertiana exquisira septenis circuitibus, quod

longifimmin eftindicatur. Li emisqui sudiu

60. Quibus in febribus aures obsurduerunt sanguis ex naribus fluens, aut alvus turbata, folvit morbum. fermin him phiènlucis appareant.

61.) Febricirantem nisi diebus imparibus febris reliquerie; foleriecidivire ne vroqui erolo imuroro

62. Quibus in febribus morbus regius ante diem lisercio in folimber. septimom accidit malum.

163. Quibus in febribus quotidie rigores fiunt,

culos, liberatab abcellu viuniuviolo les des areadil sollo

64. Quibus in febribus morbus regius, septimo, vel nono, vel vindecimo, vel quarro decimo supervenerit, bonum, nisi dextra præcordia obduruerint, si vero non, non bondini sug sus, meningasti?

65. In febribus circa ventriculum, & fortis zitus,

&cordismorfus malumo arrive ni zirdis

66. In acutis febribus convulsiones, & circa vilcera dolores fortes malum.

675 In febribus, & fomnis timores, vel convulsiones malum. Antedel sideal anter aprathing a trin

68: In febribus spiritus offendens malum, convulfionem enim lightification and quantationer in which

69. Quibus vrinæ crassæ, grumosæ, paucæ, non Ane febre, multitudo veniens, ex his tenuis iuvat; præcipue vero tales veniunt, quibus ab inicio, vel brevi sedimen inest.

70. Quibus vrinæ perturbatæ quales sunt jumen-

bet quarra die vrinam rubram, & alia ex ratione.

72. Quibus vrinæalbæ, & perspicuæ malæ, præ-

sertim si in phreniticis appareant.

73. Quibus præcordia suspensa murmurantia subrorum dolore superveniente, ijs alvi humectantur, niss slaus erumpant, aut vrinæ multitudo perveniat, hæc vero in febribus.

74. Quibus speratur, abcessum futurum ad articulos, liberat ab abcessu vrina multa, crasa, & alva facta qualis in laboriosis febribus quarto diequibusdam incipit sieri; si vero etiam ex naribus sluxerit sanguis, brevi admodum solutio sita, munco aribus

75. Si sanguinem, aut pus mingat, aut renum, aut

vificæexulcerationem fignificat, audirder al 470 ...

-xig Youri

76. Quibus in vrina crassa existente carmonlæ parvæ, aut veluti capilli vna exeuntinijs à renibus exernitur.

mul exeunt, ijs vesica scabie laborat. ...mulsen een

Quicumque sponte languinem mingunt? ijs à renibus venulam ruptam significature sino rupnos?

sic febre, multitudo veniens, ex his tennis igrans

laborat calculori omino, con iupora ingi ma la

800 Si sanguinem mingant, aut grumos, vel stillicidium vrinæ habeant, & dolor in immum incidat ventrem, & pectinem, & femen circa velicam la-Toos nunt maxique actions & deriration

81. Si sanguinem, aut pus minxerit, aut squamulas, & gravis odor adfit vesica exilcerationem sigmoneir vertitur, & in septem diebus perennasain

82. Quibus in vrinaria fistula tubercula nascuntur, ijs suppuratione facta, & eruptione, solutio.

82. Minctio noctu plurima facta parvam fignifi gar Quibuscumque tabe laborarribus capilli à

-om WinsyngLIBERVI and State

1. Onvulsio ex elleboro lethalis est.

Convulsio ex vulnere lethalis est.

3. Vbi sanguis plurimus fluxerit, singultus, aut convulsio superveniens malum.

4. Ex superflua purgatione convulsio, aut singul-

tus superveniens malum? 4 9 et dath a miga loop ne

5. Si ebrius quispiam repente obmutuerit, convul sus moritur, nisi febre corripiatur, aut vbi adhoram pervenerit qua solvuntur erapulæ vocem recuperet.

6: Quicumque à distintione corripiuntur in quatuor diebus pereunt si vero has effugerint sani faunt.

7. Quibuscumque morbi comitiales fiunt ante pubertatem mutationem accipiunt; quibuscumque

autem vigefimoquinto, commoriuntur. les tarodel

8. Quicumque morbo laterali laborantes in quatuordecim diebus non repurgantur, ij ad suppurencrem, & pectinemy & feminumay manoirs

9. Tabes fiunt maxime ztatibus à decimo octa-

vovsquead trigesimum quintum animani il and

10. Quicumque ab angina liberantur, ijs ad pulmonem vertitur, & in septem diebus pereunt, h vero has effugerint supputanturirenity ni audin O ... 2.

11. Qui tabe molestantur si sputum quod extusfiunt grave olet iniectum carbonibus, & capillià ca-

pite defluunt, lethale.

12. Quibuscumque tabe laborantibus capilli à capite deflunt, ij alvi profluvio superveniente morinntur

13. Quicumque spumosum sanguinem expuunt, ijs e pulmone eductio fie un zo allurno

14. Atabe habito profluvium alvi superveniens lethale. convultio luperveniens malum,

15. Quicumque ex morbo laterali suppurantus fi in quadraginta di bus purgantor, à die qua fit rup. tio liberantur si ve o non ad tabem transcuot.

16. Calida vbi quis sapius ea vtatur hac mala af fert; carnium efaminationem, nervorum inconcinentiam, mentis torporem, profluvia sanguinis, animi defectionem, hac ad qua mors and audoib rous

17. Frigida autem convulsiones, distentiones, dipuberracem muracionem accipilidentas regir serve

18. Frigida inimica offibus, dentibus, ncavis, ceres bro, spinali medulla calida vero vtiliscio med

opportet, exceptis ijs quibus sanguis shuit, aut shuxutus est.

20. Vlceribus frigida quidem mordax, cutem obdurat, dolorem in suppurabilem facit, liborem obducit, rigores febriles. convulsiones distentiones.

ta petfussio calorem revocat, calor autem hæ solvit razi. Calida suppuratoria est, non in omni vicere magnum ad securitatem indicium, cutem mollit, externat, dolorem sedat, rigores, convulsiones, se distentiones mitigat, se exijs, quæ ad caput attinent eius solvit gravitatem, plurimum autem confert os sime qui in capite vicera habent, se quæ cumque à frigore moriuntur, vel vicera habent, se quæ cumque à frigore moriuntur, vel vicera habent, se quæ cumque à sinde si sedi, pudendis viero, vesteæ, his calida amica, se iudicans frigida inimica, se perimens o autime.

His frigida viendum vnde fluit sanguis, aut fluxurus est, non ad ipia, sed circa ipsa vnde sluit; & que cumque instammationes, vel instammina ad rubrum, & sub cruentum sanguine resenti, tendunt, na veteribus nigredinem affert, erysipelas etiam non vlceratum juvat, nam exulceratum lædit.

Fligida qualis nix, & glacies pectori inimica,

tusses movent, & sanguinem, & destillationes.

EN. 3 .

vicere, & podragricos quoque atque convulsa hotum plurinta frigida aqua large effussa, levat, & extenuat, solvitque dolorem, nam modicus torpor dolorem solvit.

26: Aqua, quæ sito calecit, & sito refrigeratur le-

tibus fi super dormierint bonum. lous oned acorri

28. Sufiftus aromatum muliebria ducit, sapius vero, & ad alia vtilis esset, nisi capitis faceret gravitate

mense vsque ad septimum, minus vero has: resentiores autem, & seniores veteri opportet.

or Mulierem vtero gerentem capi á morbo acu-

abortit, & magis si fætus sit major misso ex vena

32: Mulieri fanguinem evomenti meustruis erum pentibus solution in experientibus high and se experientibus solution in experientibus solution experientibus solution in experientibus solution experient

33. Menstruis deficiétibus sanguis exnaribus sues bonums en realips de curcaips volt en munde la volt en la vo

134. Mulierivterogerenti si alvus plurimum profluat periculum est ne abortiat.

135. Mulieri que vterinis molestatur, aut dissiculter parit, superveniens sternutatio bonum.

36. Mulieri menses decolores nec per idem sem-

per

per te mpus venientes, purgationem indicant essene cessariam. . in quenos non recounsité meto en in

375 Mulieri vtero gerenti, si mammægraciles re-Te of he mentun heri.

pente fiant abortit.

38. Mulierivtero gerenti, fi alrera mamma gracilis fiat geminos habenti alterum abortit, & siquidem mamma dextra gracilis fiat, marem, si vero sinistra fæminam. & marca premending drus.

30 Simulier, quæ neque gravida est, neque peperit lac habet, huic menstrua defecerunt. maun mal

40: Quibuscumque mulieribus ad mammas san-

guis colligitur furorem fignificat.

ATO Si velis noscere an conceperit mulier, cum dormitura est ci aquam mulsam potandam da, & se si alvitormina patietur, concepit: si minus con conmuantur fi vero ruefus dura fiact, don ancaiqao

38 42: Mulier si marem concepit bene colorata est, si vero fæminam male colorata est. mocmunos uca in 4310 Si mulievis gravidæ in vtero sit erysipelas, le-

mi elt necessarium. thale.

-1744. Quacumque prater naturam tenues existentes vtoro gerunt abortiunt prius quam crassescant, 145. Quxcumque mediocriter corpora habentes abortiunt secundo, vel terrio mense fine ocasione. manifesta ijs acerabula vteri plena mucoris funt, & non possunt expondere fæsum continere, sed dissum

gr. Si menfina plura fiane accidune modusnaqui 46. Quecamque preternaturam crasse non con

cipiunt vtero, ijs omentum os vteri comprimit; & prius quam extenuentur non concipiunt. mun his 3 5 20147 li Si vierus incoxam verguens suppuratur necese est linamentum fieri. pente fiant abortic. -348. Færus mares quidem in dextris, fæminæ in ficilis fiar gerninos habenti alterum abezigam zirfliri-149. Vt secundæ procidant sternutatorio imposito, & nares aprehendito, & os. nistra factionan. . 370. Mulieri si velis menstrua cohi bere cucurbitulam quam maximam ad mammas apponessi asl siz Quævtero gerunt ijs vteri os comprimitur 52. Mulieri vtero gerenti si lac multum è mammis efflunt fætum imbecillem fignificat: fi veromamæ solidæ fuerint fætum significant saniorent 10h 53: Quæ corrupturæ sunt fætus ijs mammæ extenuantut: si vero rursus dura fiant, dolor, aut mammas, aut coxas, aut oculos, aut genua infestabit, & fixero familiam male colorata eff. anoquinos non . 3 546 Quibus os vteri durum est ijs vteri os comprimiest necessarium. elale. -11955 Quæcumque vtero gerentes à febribus corripiuntur, & fortiter extenuantur fine ocasione manifesta difficulter pariunt, & cum periculo, aut abortum facientes periclicantures coloubel muireds 56. In fluxu muliebri, si convulsio, & animi defestus advenent malum: n) erelenogra enulloquen 57. Si menstrua plura fiant accidunt morbi, & si confiant ex vteto morbi contingunt 58: Re-

78. Recto intestino, aut vtero inflammationem patiente, vrinz stillicidium accidit, & renibus purufentis vrinæ advenit stillicidium, hepati autem inflammationem patienti singultus advenit.

59. Si mulier non concipit, scire autem velis si concepturalit, pannis circuntectam de lubter suffias, & si odor videatur per corpus ire ad nares, & os, scito, quod ipsa non exse ipsa sterilis est.

60. Si mulieri vtero gerenti purgationes eant im-

posibile est fætum esse sanum.

6r. Si mulieri cessent purgationes, neque febris, neque rigor superueniat, & fastidia incidant, iudica

ipsam in vtero habere.

62. Quæcumqué fiigidos, & spissos vteros habent non concipiunt, & quacumque prahumidos vteros habent:non concipiunt stinguitur, enim in eis genitura: & quæcumque ficcos magis, & adurentes, nam ex defectu alimenti corrumpitur semen, quæcumque vero ex vtriusque mediocrem habent temperaturam, ha facunda funt. 1111.26 11

63. Similiter autem, & in maribus, aur enim prop ter corporis raritatem spiritus extrafertur, vt semen non transmitatur ad os, vel propter spissitudinem humor non exit foras, vel propter frigiditatem non concalecit, ita vt ad hunc colligatur locum, vel

proter caliditatem hoc idem accidit.

64. Lac dare caput dolentibus malum, malum ve ro, & febricitantibus, & quibus præcordia suspensa

murmurant, & siticulosis, malum autem, & quibus in febribus acutis biliose sunt deiectiones, & quibus fanguinis multi deiectio est: convenit autem, & tabidis dare, qui non valde multum febricitant, & in febribus longis, & parvis, si nullum exsupra dictis signis assurer, & præter rationem consumptis.

65. Quibus tumores in viceribus apparent non conveluntur maxime, neque in saniunt, verum his evanescentibus repente, quibus quidem atergo convultionis, & distentiones fiunt, quibus vero in anteriori parte insania, vel dolor lateris acutus, vel suppuratio, vel difficultas intestinorum, si tumores sunt rubicundi.

66. Si in vulneribus fortibus, & pravis, tumor non appareat ingens malum.

67. Molles boni, crudi vero mali.

68. Dolenti partem capitis posteriorem in fronte

recta vena incissa, prodest.

69. Rigores incipiunt mulieribus quidem ex lum bis magis, & perdorlum ad caput, led, & viris lparte corporis posteriore magis, quam anteriore, veluti semorum, cubiti; sed, & cutis rara, inditio autem est pilus.

70. A quartanis capiti, non admodum á convulfionibus capiuntur, si vero prius capiantur, & quar-

Bana supervenerit liberantur.

71. Quibus cutes circuntenduntur arida, & du-12 fine sudore moriuntur: quibus vero laxa, & rara,

cum sudore moriuntur. 72. Qui regio morbo laborant non multum ventofi funt:

LIBER VI.

I. IN longis levitatibus intestinorum si ructus acidus fiat qui prius non erat signum bonum.

2. Quibus nares natura humidiores, & genitura humidior, minus integra sanitate fruuntur; quibus vero contraria salubrius degunt.

3. In longis difficultatibus intestinorum inedia

exfastidio, malum, & cum febre peius.

4. Vlcera circum glabra prava sunt.

5. Dolores, qui sunt ex lateribus, & pectoribus, atque alijs partibus an multum differant perdiscendu.

6. Renum, & vesicz vitia in senioribus difficulter

fanantur.

7. Dolores ventris sublimes, leviores, qui vero non sublimes, fortiores.

8. Aqua inter cutem laborantibus, vicera in corpore facta difficulter sanantur.

9. Latæ pustulæ non admodum pruriunt.

10. Caput dolenti, & circumdolenti, pus, vel aqua, vel sanguis esuens per nares, aut os, aut aures, morbum folvit:

11. Atrabile vexatis, & phreniticis hæmorhoy-

des supervenientes, bonum.

12. Adiuturnis sanato hæmorrhoydibus si vna no

servatur periculum est aquam inter cutem, vel ta-

bem, advenire.

13. A singultu habitum, sternutatio superveniens liberat.

14. Ab aqua inter cutem habito, si aqua évenis in ventrem defluxerit, solvitur morbus.

15. A longo alvi profluvio habito, spontaneus vo-

mitus superveniens, morbum solvit.

16. A morbo lateri, vel pulmonia habito alvi pro fluvium adveniens malum.

17. Lippientem alvi profluvio corropi bonum.

18. Vesica discissa, aut cerebro, aut corde, aut cepto, aut aliquo extenuoribus intestinis, aut ventriculo, aut iecore, lethale est.

19. Cum descissum fuerit os, aut cartilago, vel nervus, aut genæ particulatenuis, vel præputium, ne

que augetur, neque coalescit.

20. Si in ventrem sanguis præter naturam effunditur necesse est suppurari.

21. In infanientibus si varices, vel hæmorroydes

supervenerint insaniæ solutio.

22. Quæcumque rupta ex dorso ad cubitum decendunt venæ sectio solvit.

23. Sitimor, atque mæstitia longo tempore persevérent, ex eo atrabilis significatur.

24. Si quod intestinorum gracilium discindatur, non coalescir.

25. Erysipelas ab exterioribus verti ad interiera non

95.

bonum. ab interioribus autem ad exteriora

lirio solvuntur.

27. Quicumque suppurati, aut aquam intercutem patientes vruntur, aut secantur, sipus, aut aqua, vniversim essuxerit omnes moriuntur.

vi fiunt. Job snomer reque sinder sid, snow ann all

29. Mulier podraga non laborat nisi menstrua de-

fecerint.

30. Puer podraga non laborat ante vium venere reorum.

aut fomentum, aut venæ sectio, aut medicamentum epotum solvit: la salid Alonalisamentum

32. Balbi, ab alvi profluvio longo maxime ca-

33. Qui acidum eructant, non valde morbo lates

34. Quicumque calvi sunt ijs magnæ varices non fiunt, quibus vero calvis varices magnæ superveniunt, ij rursus capillati sunt.

35. Aqua inter cutem laborantibus tussis superve-

36. Difficultatem vring vena secta invate secare vero interiores.

37. Ab angina habito, situmor fiat in collo bonum, DOCUTE).

foras enim morbus deducitur.

38. Cancros ocultos omnes, melius est non curare, curati enim sito percunt, non curati vero longius tempus perdurant. A Manageral and and a

29. Convulsio fit, vel ex repletione, vel inanitione,

ita vero, & fingultus on connumerous me merice

40. Quibus dolor circa præcordia fit absque inflammatione, his febris superveniens dolorem solvie surbanne nonlabour till med sir sir

41. Quibuscumque suppuratio in corpore existens, non innotescit, ifs ob crassitudinem puris, aut loci non innotescit.

42. Morbo regio laborantibus, si siat hapardurum malum pa us einde une en un mon emel que

43. Quicumque lienosi à difficultate intestinoru capiuntur, ijs superveniente longa difficultate inteltinorum, aqua inter cutem, aut levitas intestinorum advenit, & moriunturi, in the me municipals

44. Quibus ex stillicidio vrinzileos supervenerir, in septem diebus perennt, nist sebre superveniente

fatis vilna Auxerices into are an entemp one

45. Vlcera quæcumque annua sunt, aut etiam diu turniora, os abcedere es necessarium, & cicatrices cavas fieri.

46. Qui gibbi ex althmate, aut tusti fiunt ante

pubertatem, moriuntur.

47. Quibuscumque vene sectio, vel purgatio cum

96.

medi camento convenit, hos vere purgare, vel venam incindere opportet.

48. Lienosis difficultas intestinorum supervenies

bonum.

49. Quibuscumque morbi podagrici siunt, ij sedata in quadraginta diebus inslammationne siniunt.

50 Quibuscumque præcinditur cærebrum, ijs ne-

cesse febrem, & bilis, vomitum supervenire.

ji. Quicumque sani dolore capitis repente capiuntur, & statim muti siunt, & stertunt, in septem

diebus pereunt, nisi febris aprehenderit.

52. Opportet vero, & conciderare oculorum in dormientibus suspectiones, nam si quid alvum non commissis palpebris sub inspicitur, neque ex alvi profluvio, aut medicamenti potione istud contingat malum est, signum & lerhale valde.

53. Decipientæ, quæ cum rissu fiunt securiores:

quæ vero cum studio periculosiores.

54. In acutis passionibus, quæ cum sebre sunt, luctuosa suspiria malum.

55. Dolores podagrici vere, & autumno magna ex

parte moventur.

5 In morbis melancholicis ad hæc periculossi decubitus stuporem corporis, vel convulsionem, vel furorem, vel cæcitatem significant.

57. Aploplexix autem fiunt maxime, à quadra-

gessimo anno, vsque ad sexagessimum.

58. Si omentum excidat, necessario put sescit.

59. Quibuscumque à coxendicum dolore molestatis exidit coxa, & russus incidit, ijs mucores superveniunt.

60. Quibuscumque à coxendicum dolore molestaris diuturno exidit coxa ijs crus tabescit, & claudi-

cant, fi non yrantur. o Quanta mague pirribairen eza eta di O

Solor alliand Bie Raiville and Communication

t. In morbis acutis frigus partium extremarum,

2. In osse ægrotante caro livida malum est.

3. Avomitu singultus, & oculorum rubor malum.

4. A sudore horror non bonum.

5. A furore difficultas intestinorum, vel aqua intercutem, vel mentis alienatio bonum.

6. In morbo diuturno fastidium cibi, & deiectio-

nes synceræ malum.

7. Ex multa potione rigor, & decipientia malum.

8. A tuberculi intus ruptione, exfolutio, vomito, autanimi defectio fit.

9. A profluvio sanguinis decipientia, ac convul-

ho, malum.

10. Abileo vomitus, fingultus, decipientia, vel

11. A morbo laterali inflammatio pulmonis ma-

12. A pulmonis inflamatione phrenitis, malum.

13. Ab æstibus fortibus convatiro, aut distensio,

malum.

14. In capitis ictu obstupescentia, & decipientia malum.

15. A sanguinis sputo puris sputum malum.

16. A puris sputo phthisis, & fluxus, cum vero Sputum retinetur moriuntur.

17. In hapatis inflammatione singultus malum.

18. In vigilia convulsio, vel decipientia.

19. Inollis exustione erysipelas.

20. Ab erysipelate putredo, aut supuratio.

21. A forti in viceribus pulsu, profluvium sanguinis.

22. A ventris dolore diuturno suppurario.

23. A deiectione sincera difficultas irresti norum malum.

24. In ossis præcissione decipientia si in vacuum aprehenderit.

25. Exmedicamenti potione covulsio lethalis est.

26. Inforti dolore ventris, partium extremarum frigiditas malum.

27. Mulieri vtero gerenti fi tentio supervenerit fa-

cit abortum.

18. Quando os, aut cartilago, aut nervus ablinditur in corpore non augetur.

29. Qui alba pituita detinetur si fortis ventris fluxus supervenerit, à morbo liberatur. 30. Quilius in alvi profluvijs excrementa spumo-sa sunt ijs ex capite pituita dessiit.

31. Quibuscumque febricitantibus in vrinis fiunt sedimina veluti farina crassiorlongam ægritudinem fore fignificar.

32. Quibus autem biliosa sedimina supra tenuia,

acurum morbum significat. 9 2009, 2129 1 10

33. Quibuscumque vrinæ distantes sunt, ijs turbatio vehemens in corpore fit.

34. Quibus in vrinis bullæ insident morbum rena

lem, & longum fignificant.

35. Quibus infidens pingue, acacervatum, ijs re-

num witium acutum fignificatur. The cast A

36. Quibus autem morbo renali laborantibus prædicta accidunt signa, doloresque circa spinæ musculos frunt, fiquidem circa loca exteriora frant abcessas quoque exterius futuros specta; si vero do lores magis circa interiora fiant, etiam abscessus expecta futuros interius.

· 37. Quicomque evomunt sanguinem, si sine sebre quidem salutare, fi vero cum febre malum: curare vero opportet ad strigentibus, & perfrigerantibus.

38. Distilationes in ventrem superiorem suppu-

Fantur intra viginti dies.

39. Si quis fanguinem minxerit, & grumos, & stillicidio vrinæ laboret, & dolor inciderit infermur, & imum ventrem, pectinemque, que circa vecicam male se habere significantur, and all and the second

98.

40. Si linga repente incontinens fiat, aut aliquapars corporis stupore elanguir, tale ele meiencholi-

41. Si senioribus supra modum purgatis singul-

tus supervenerit non bonum.

42. Si febris non ex bile habeant, multa aqua calida capiti super infusta, solutio fit febris.

43. Mulier, ambidextera non fit.

pus purum fluxerit, & alvum, evadunt; si vero sub cruentum, & fæculentum, ac fetidum percunt.

45. Quorum hæpær suppuratum ad vritur si pus purum sluxerit, & alvum evadunt, in tunica enim his pus continetur, si vero qualis amurca sluar pereunt:

46. Dolores oculorum post meri potionem ; & aquæ calidæ balneum, benæ sectione curato.

47. Aqua inter cutem laborans si à tussi habeatur

desperatus est.

48. Vrinæ stillicidium, & mingendi difficultatem, vini potio, & venæ sectio folvit, insidere autem interiores.

49. Ab angina habito tumor, & rubor in pectore superveniens, bonum, extra enim vertitur morbus.

50. Quibus cærebrum sphacelatum, idest corruptum est, in tribus diebus pereunt; si vero os evasferint sani siunt.

bro, aut humectato eo, quod in capite inani, aer
Aa 2 enim

enim intur contentus extra erumpit: sonat autem quoniam perangustum ipsi est exitus.

52. Quicumque hæpar circum dolent, ijs febris

superveniens solvit dolorem.

53. Quibusà venis sanguinem mittere confert, ijs

vere venam opportet secare.

54. Quibus interventriculum, & septum pituita reposita est, & dolorem affert non habens exitum, neque ad alterum ventrem, ijs per venas ad vesicam pituita versa solvitur morbus.

55. Quibus hæpar aqua plenum in omentum erumperit, ijs venter aqua repletur, & moriuntur.

256. Alyce, idest, anxitudo, oscitatio, horror, vinum æquale æquali potu, solvit ægritudinem.

1957. Quibus in vrinario meatus tubercula fiunt ije supputatione sacta, & suptione solvitur dolor.

158. Quibus carebrum aliqua ex causa concus-

sum fuerit necesse est statim mutos fieri.

190. Corporibus carnes habentibus humidas famem adhibere convenit, fames enim corpora ficeat.

frigeratur, & rurlus cal'est, aut colorem alium ex alio commutat, longitudo morbi fignificatur.

61. sudor multus calidus, vel frigidus semper slues.
homorem abduci opportere, robusto quidem supra,
devili vero infra significat.

62. Si quis cibum febricitanti dederit, vt sano 10-

bar ficlaboranti, morbus, a come must be wid

63. Que per vesicam excernuntur inspicere opportet si talia qualia sanis excernuntur, que igitur minime similia sunt his hæc morbo siora, que vero

funt sanis similia, hæc minime morbosant of the

64. Et quibus délectiones si stare permisseris, & non moveris, veluti strigmenta subsistant, & si pauca paucus est morbus, & si multa multus: ijs confert alvi purgatio, quod si alvo non purgata dederis sore bitiones quanto plures dederis tanto magis nocebis:

65. Quibuscumque cruda infra deijeiuntur, quoniam atrabilis inest, si plura maior, si pauciora, mi-

nor est morbus.

66. Ex creationes infebribus non intermittentibus lividæ, sanguineæ, biliosæ, & setidæ, omnes malæ: cum vero bene excemuntur, bonum est, & per ventrem, & per vesicam, & vbi aliquid secedens steterienon purgatum, malum.

67. Corpora opporter voi quis purgare voluerit fluida facere, & si supra sistere alvum si vero infra,

humectare.

68. Somnus, vigilize, vtraque modum excedentia

69. In febribus non intermitentibus si exteriora frigent, interiora vruntur, & febris habeat, lethale.

70 In febre non intermittente, si labrum, aut nasus, autoculus, aut supercilium pervertitur, si non videat, si non audiat, & iam debilis sit, quicquid horum suerit, mots prope est. 71. A pituita alva aqua intercutem sepervenit.


172. Adaron profluvio difficultas intelline rum,

73. A difficultate intestinorum, levitas intestinorum supervenit som and sinon de si moderni se

74. A corruptione abscessus offis.

75. Asanguinis vomitu, tabes, & puris purgatio supra, in tabe fluxio ex capite. influxione alvi profluvium, in alvi profluvio aftricio purgationis, superioris, in astrictione mors is the same of the same

76. Qualia fuerint vesicæ, aut alvi excrementa, & ex carnibus, & sicubi alibi natura corpus exierit, si parum paucus est morbus, si multum multus, si val-** * non de multum, lethale est.



Similar of Control States and the control of o l'il disponint en ment fillaberris aut na-Livenite of uses and for continue perferience if non

er , nor a wiar & is no dobi is inquicaul ho-

100. 中部中部分子等等十()十分的中部分子等等。 中部分子等等十分。

APHORISMI AD

febres pertinentes.

a. C		5 1 3		- 41 (4 4	
Libro.	Aphor.	el.	\$	Libro.	Aphor.	
De tertiana.		+	李本	220	7:	
3.0	21.	1		3.	II	
4.	43.+	11	T	3.714	9.	
4.	59.	- 3	\$	4.1	37	
De qartana.		\$ \$4 \$4	100	4.1	663	
2.	25.		2	6.8	55.	
3.	21.	200	*	7.87	I.F	
3.	28. 11	3,72	3	De febrib	us longis.	
in the	70.		ရှို့ ရှို့	2.0	25.	
De quotidiana.		. 3	300	2.	28.0	
	172 "	0.2	ST.	3	16.	
	63.	. 5 . 24	25°	30	27	
	ausone.	17 Jan.	300	4.	36.	
	21	9 10		103	44.	
4.4	54.	6 14	900 900	4.5		
4.	58.	· 4		44	515	
6.	26.		35	. 4. minimal hit as	53	
		100	000	Dech	્દું 65 ન 🗆	
Deacuta febre.		23	**	De febre continua!		
1.	14.	6 5.	576	3:	21	
2.1	19.	Car.	2	4.6	43.	
-6)					Ti	

.000			*-	
Libro .	Aphon		Libro.	Aphor.
4.7.30		de	14.4. 4	-
4.	47.		A S. I	TIZIA
41		L. La		
4	49.	6	De conve	Mone in fe-
	50. 56.	ا ما الما الما الما الما الما الما الما	bril	ous.
4.	66.		2.302.	
72	69	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Asin	
	704		. 4.	66.
De febre	intermite	nti.	4	67.
	11,	* 4 * \$	4.00	68
661	124	65 9	titati č.	p . 5.3
497	30.		50.5	70.
	43	1 112	De reliqu	is simptho-
aightei as	di 59		ia .	febrium.
4.00	63.	1 60	2.	
	refebris.	6	4-1	31.
	12.8	1	4.	4
350	9.			2:35.
ু 3 ১৪ 4 ৯১	26.		4	
4.7	37	୍ 🏥 ପ୍ର	4.	
4.	56.		4.	48.
Derigo	re febriur	n.	40.5	49
endino"	29.	The Contract of the Contract o		10.50
400	46.	- 60 60 60	§ 49.1	5 1,4;
454	58	114	401	52
II				, 11-
- 4				,

Libro.	Aphor	the second	2	Libro.		r.
	553.	G. N.	*	42	270	
4	54.	25°14	93	6	3=19	
s igillar	55.	17.	1	Aphorif		201-
.43	60.		*h	os partic		
245	62.	SEA.	- T	antes suxt	a ordine	ना थे
, As	64.	10 P		Casring. a		
23	65.	少.	3.7	rem ob	Grysma	nifOc
70	66.	0-3	930		Apho	
(A)	67.	A STATE OF THE STA	4	De dolo	aipito	
	68.		*	DC WOOD		150
4.5 4.5 6. 6. 6.	69.	6.2	0,0	3. 3. 3.	13.	
40,		51.50 F	2	3.	17.	
40	74.		*	5.	23.	
6	26.	1319	900	46	70. 22. 28. 68.	
6	44.	1 68 1 68	*	shifting	72.	
0	50.	1	**	5.	28.	
0.	51.	60	200	5.	68.	
6.	54.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	910	5. 6.	69.	
7:	3t.	A L	*	6.	IO.	
7.	37-		3	6.7	51.	
7	69.	17 EE	35	7.	14.	
De victu o	mnibus	febric	i- B	Dele	r4.	
	conveni	enti,	3	3.	30.	
I.	II.	# 5 # 5	0.00	Deap	oplexi	
T.	14.	16.1	*	2.	42.	
45	16.	E. A.		4.3%	16.	
(Do,	19.	2 12		. 3.	15.	
4	17.	00	3	43.	13.	
and a second				Bb	· 9 ·	Lie

101					4 9
Libro.	Aphor.	218. 218.		Libro.	Aphor.
6 and	Aphor.		3	Ded	clirio.
	60.	61 16	3	2.	2.
7.1	lancholis	100	2	Decon	vulsione.
Demo	;ianchon.	60,	7	2.	
	20.	18863. 1973	. 98		25.
		.] 金	\$	4.	16.
	on the same was		200		
, or A. mis		40 Kg	- 35e	4.	57. 66.
70.6.A	II.	45	\$	4.	
6.		8 %. F		4.	67.
6.	13.	- 8 ×	900	4.	68.
6.	56.	433	*	50	L
7.	6.	# J.	erre erre	.5	20
7.	42.		- The	5.	33
		10 A	3	5	4.
Dep	hrenitide	4 .3 .	20	.53	563
3.	30.	1 1	35	.53	6.
3· 4·	30. 72.	3	4		21.
7.	17.		36	5.	22.
15	ε.	i en	3.	.5.	
	ecipientia	1 DE	and the same of th	.5.	25.
б.	53.	445 m	870	.52	57.
7.	155.	Ac1		sas 2 mg	0 16625
7.	7.	ا کی			21107121
	9.	÷ >-	6.00	6.	39-
7.	TO.	- 500	**	6.	56.
7.	14.	\$ 1.	93°	.7.	9.
7.	18.	and the	35	.75	10.
	3 6		\$	7.	13.
.7:	25:	Will state	·	1 2 2	
(3.6.	· U ·				

L

3×3.6

Tibro.	Aphor.		Libro.	Aphor.	•
.7.	18.	*	3. A	13. ·	
7.	26.	DAG STATE	. 3.	(a) 14.	
De	estupore.	- A	3.	20.	
7.	14.		3.	27.	
7.	41.	9	3.	31.	
De affecti	bus oculo	orum.	4	25.	
3.	12.		4.	27.	
.3.	14.	3	4.	49.	
3.	17.	3	4.	60.	
3.	31.	3	5.	33.	
4.	49.		5.	44.	
. 4.	52.		5. 2 6.	60.	
6.	31.) Q		rnutation	7
	1033.		De Ro		of.
7.	48.			27.	がなる
	Aibus auri	uiii.	7.	53.	
3.	5.	F		ectibus or	is.8c
3.	17. 21.	. (8		nguæ.	
- 3.	21.	\$	3.	21,	
3.	31.	5 y4	多 3.		
3. 4.	38.	eg e	6.		
4.	49.		7.	-	
4.	60.	1		Aib.denti	ium.
6.	,10.		3.	150 25.	-
	ctibus nar	ium.	4.	53.	
2,	40.	19.30	\$ 5.		
1.1				ι. •	Li-
*					

9807			,		
Libro.	Aphor	P. P.	3	Libro	Aphor.
De affect.	gingibar	um, 8	3	.3.	13.
in a lat	ioium.	2773	9	.3:	20.
3·	2.	4 3	35	3.	1
4.	49.	\$ 2.7 - 4.14	\$.3.	3Ţ.
Deaffe	ct. gutu	ris.	36	v 4.	54.
2.	43.	\$ 141 m	1 900 T	1 unos	18:24. 5G
, 3e	16.	97	8	6,	35.
.3.	20.		4	6,	46.
- 3.	22.		300	7.	49.
4.	34.	# #-		Dev	
· A.	35.	My C S	*	. 5.	5.
.5.	70.	The state of the s	200	6.	51.
6	57.	20 4		7:	60.
.9a-7-tion	10 St.		\$	De sputo!	languinis.
De affect. p	ectoris,	& pul-	**	3.	29.
monis, & 1		elitu.	900	101.40	25.1
3.	22.	\$		5.	13.
Baia 3. with		4	\$	6.	IO.
3.300	26.	3	90	7.	15.
3:	30.	No.	3	De pleu	ritide.
4	31.	16.	Š	I.	12.
4.	34.	· 189	3	3.	23.
	50.	10.8		. 5.	8.
14. A.	68.,	1 4	1	5.	15.
De 1	inli.	* *	4	6.	5.
, 2.	40.			15. 6, 17	16.
. 3:	5.			6,	33.
-1 L					Liè

		,			10	3.
Libro.	Aphor.		Li	bro	Aphor.	
78	11.	*	-	4.	14.	
	ineumonia		is a	5.	1 5 m	
3.	23.	1	5 10	6.	65.	
	30.			7.	16.	
6	16.	G	P De	eaffeE	t. Cordis.	
7.	IIJ	- S ,		2.	36.	
7	12.	1	i.	2. +	41:	
De e	mpiemate	•	*	4.	17.	
5.	8.	4,3		4.	16.	
5.	10.	1	STE STE	5.	57.	
5.	15.	1 1/2	\$	6.	18.	
5.1	20,	10	nge	70	8.	
	65.	er file eri eri	a De		t, mamm	12-
6.	41.	6 Pa	*	1.1 m	ım. 🖔	
19007.	20.	-	3	5:	37.	
7.	. 23.	d.	35 35	. 5.	38.	
7.	39.		ulier Ulier	5:	39.	
7.	46.	4311	*	5.	40.	
· De	Tptify.	in	010 010	5.	50.	
.83.	13.10	18.	000	5.	53.	
.3.	12.		*	5:	54.	
3.	29.	10	T D		t. ventri	culi.
4.	8.	5 160 5 18	100 mg	T.	2.	
.85.	6.	0 E p	**	· I.	17. 65.	
5.	11.	6.3	200	4.	65.	
5.	12.		300 300	16.	7.	
5.	13,		75	6.	18,	
al.					Bb2.	Li-

a ^ _				
Libro.	Aphor.	9	Libro.	Aphor
	23.	4	7.1	8.
7. 5	56.		\$ \$ 507 CO	
Desi	ci.	SWG S	7.	38.
2. 4. 4.	4.4	4 60	7. De fin	47.
L.	70		De jir	igultu.
4	48	521 S	5.11	3:47
4	2.4.		d See	4.
4.	27.	45 B		50.
)23 ·	65.		6	30
Devon	nitu.	9	7	391
1.2	2		7.0	200
en 3-am e	21.		7.	17
3. 1111	24.		7.	42.
3	4.		5. 5. 6. 6. 7. 7. 7. De affect. 4. 4. 5.	hypocond.
4.	6.	200	4.	. 64.
.4.	7.		4	73.
. T.	8		5.	73. 65.
,r 4 .	12.	er e	6.19	40.
.4,	13.		De affect.	nepatis.
1 P C	, ,		5	59.
Tien neterical			6. 6.	18.
	22.	5 To	ж Ж	42. 18.
. Ac	25.	200 E	70	To.
100	3.2.	The state of the s	₹ .7.	
6.	35.	Wind Single	7.	54.
34.6	3.	4	\$.7.	7/·
The said				ز الله

		1	1			4.
Libro.	Aphor.	-		Libro.	Aphor.	
DeHv	drope.		4	4.	24.	
	0.3	10	6 00	A	24. 26.	
	22.	ż	*	400	.0"	
4.	II.		ର୍ଗ୍ରହ ବ୍ରହ	4.	28.	
6.	8.		*	5.	12.	
6.	14.		ရှိနှင့်	4. 5. 5.	14.	
6.	27.		0.0	5.	24.	
	2,5	- "	4	2	36. 15. 16.	
	35.		910).	3	
7.	5		\$	0.	ქ•ე_	
7.	41.		60	6.	15.	
7.	57.		50	6.	16.	
7. De hict	eritia.		9	6.	17.	
4	62		000	6	22.	
4.5	6.1	14A.3	4	6	3.4	
45	64.		900 900	0.	340	
.5.	75.	6,	1	6.	30.	
6.	42.		The state of the s	6.	52.	
4. 4. 5. 6. De affe &	t.lienis.		900	5. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 7.	17. 32. 34. 38. 52. 5. 24. 30. 31. 29.	
2	7.7.		4	7.	24.	
9.	43. 48.	الله به الله به	00		20	
0.	43.	8	*		30.	
0.	43. 48. ofluvijs al		10	7.	31.	
De pro	ofluvijsal	Vi.	900	7.	29.	
2.	TA	الر	*	7.	80.	
3.	16.		ပါပု ၅	7.	80. 82. vefifæ.	
	35		李	Deaffed	velila.	
. 3.	(4).	23 1 .	900	Deantect	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
. 3.	.30.	Ja. v		10 tu 3.00	10 10	it.
. A	21.	9 00	್ಷಾ	.:3.	10.	
.24.	16. 25. 30. 21.	e .	000 010	. 3.	22.	
4.	23.		വ്യ	3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3	16. 22. 31.	
	1 9 3	140	4			Li-
h.						Sand & G

, <u>.</u>		(
Libro.	Aphor.		Libro	Aphor.
4.	69.	*	5.	64.
4.	70.	ର୍ଜ ବୃତ୍ତି	5. 6.	
4. 4. 4.	70. 71.	1	Deaffe	ect. vter
Α· ·	72.	**	3.	12.
4.	72. 73.	96	3.	14.
4. 4.	75	500	3· 3·	28.
4.	74. 75. 76. 77. 79. 80.	4	7	1.
4.	7).	000	4. 5.	22.
4.	_/0.	1)•	28.
4.	7/•	4	5.	20.
4.	79•	90	5. 5.	29.
4.	80.	3	5.	30.
4.	81.		5.	29. 30. <i>C</i> 31. 32.
5.	22.	200 200	5.	32.
5.	69.		5.	33.
4. 4. 5. 5. 6.	69. 6. 8.	930	5. 5.	34.
6.	8.	970	5.	35.
6.	44.		5. 5. 5.	35. 36.
7.	33.	90	5.	37.
2.	34.	% %	5.	37· 38.
2. 7. 7.	35-		17 375 W.	39.
7.	40.	%	5.	41.
7.	40. 50.	- Sig	5.	42.
د اود د	1.3056.00		5.	43.
De affen	t.pudendo	mm.	. 5.	44.
- Lanco	21.		5.	45.
3· 5· 5·	22.	**	5.	16
2.	62	66		46.
3.	63.		5.	4/•

Li-

(



